

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada pra lansia dan lansia di puskesmas Kramat Jati tahun 2011 = Factors related to Hypertension in the middle age and elderly in district health center Kramat Jati in 2011 / Elza Estirina

Elza Estirina, author

Deskripsi Lengkap: <http://lib.ui.ac.id/detail?id=20440938&lokasi=lokal>

---

Abstrak

**ABSTRAK**

Meningkatnya angka harapan hidup penduduk Indonesia, maka dapat diperkirakan bahwa penyakit degeneratif akan meningkat pula. Salah satu penyakit degeneratif yang mempunyai tingkat morbiditas dan mortalitas tinggi adalah hipertensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada pra lansia dan lansia di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pra lansia dan lansia di Puskesmas Kecamatan Kramat Jati, sampel diambil dengan metode simple random sampling. Hasil penelitian ini adalah prevalens hipertensi pra lansia dan lansia sebesar 60,2%. Menurut hasil analisis bivariat dari tujuh variabel independen yang diteliti terdapat dua variabel yang terbukti secara statistik memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian hipertensi yaitu umur dengan nilai  $p = 0,046$  ( $< \#945;$ ) dan nilai  $OR=2,3$  dan status gizi lebih dengan nilai  $p = 0,015$  ( $< \#945;$ ) dan nilai  $OR=2,7$ . Sedangkan lima variabel lainnya tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian hipertensi yaitu jenis kelamin, status perkawinan, riwayat keluarga, pekerjaan, dan pendidikan yang memiliki  $p > 0,05$ . Menurut hasil analisis multivariat didapatkan bahwa variabel yang memiliki kontribusi yang paling mempengaruhi kejadian hipertensi adalah status gizi lebih dengan nilai  $p=0,013$  dan  $OR=2,8$ .

<hr>

**ABSTRACT**

Increased life expectancy of the population of Indonesia, it can be estimated that the degenerative diseases will increase as well. One of the degenerative diseases that have high rates of morbidity and mortality is hypertension. This study aimed to determine the factors associated with incident hypertension in pre-elderly and elderly in Kramat Jati subdistrict health centers. This research is quantitative research with cross sectional research design. The population in this study were all middle age and elderly in Kramat Jati subdistrict health centers, samples were taken by simple random sampling method. The results of this study is the prevalence of hypertension pre-elderly and elderly by 60.2%. According to the results of bivariate analysis of seven independent variables studied, there are two variables that are statistically proven to have a meaningful relationship with the incidence of hypertension that is age with the value  $p = 0.046$  ( $< \#945;$ ) and  $OR = 2.3$  and the value of nutritional status is

more to the value  $p = 0.015$  ( $< \#945;$ ) and the value of  $OR = 2.7$ . Meanwhile, five other variables do not have a meaningful relationship with the incidence of hypertension that is sex, marital status, family history, occupation, and education that have  $p > 0.05$ . According to the results of multivariate analysis found that variables that have contributed the most affecting nutritional status of the incidence of hypertension is more to the value  $p = 0.013$  and  $OR = 2.8$ .