

Pengaruh latihan penggunaan tongkat terhadap pola jalan pada Hemiplegi Strok Iskemik

Gunawan Santoso, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=108637&lokasi=lokal>

Abstrak

Tujuan : Mengetahui pengaruh latihan penggunaan tongkat terhadap pola jalan pada hemiplegi strok iskemik

Disain : Pra dan pasca perlakuan dengan kelompok kontrol

Subyek : 40 orang dibagi secara random permutasi blok menjadi dua kelompok

Tempat : Poli Klinik Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Rumah Sakit Dr.Hasan Sadikin (RSHS)
Bandung.

Intervensi : Untuk kelompok perlakuan diberi latihan jalan dengan menggunakan tongkat, kelompok kontrol diberi latihan jalan.

Parameter : Kecepatan jalan, cadence, step length, stride length, stride width

Hasil : Pada kelompok perlakuan terdapat perbedaan yang bermakna terhadap kelompok kontrol : Kecepatan jalan ($p=0,031$) meningkat pada minggu keempat, Cadence ($p=0,037$) meningkat pada minggu ketiga, Step length ($p=0,025$) meningkat pada minggu ketiga, Stride length ($p=0,016$) meningkat pada minggu ketiga, Stride width ($p=0,002$) menurun pada minggu kedua.

Perubahan Cadence secara keseluruhan kelompok perlakuan dari minggu pertama hingga keempat ($p=0,000$) lebih bermakna dari kelompok kontrol ($p=0,002$). Perubahan Step length secara keseluruhan kelompok perlakuan dari minggu pertama hingga keempat ($p=0,000$) lebih bermakna dari kelompok kontrol ($p=0,001$). Perubahan Stride length secara keseluruhan kelompok perlakuan dari minggu pertama hingga keempat ($p=0,000$) lebih bermakna dari kelompok kontrol ($p=0,616$). Perubahan Stride width secara keseluruhan kelompok perlakuan dari minggu pertama hingga keempat ($p=0,000$) lebih bermakna dari kelompok kontrol ($p=0,002$).

Perubahan kecepatan jalan secara keseluruhan kelompok perlakuan dari minggu pertama hingga keempat ($p=0,000$) lebih bermakna dari kelompok kontrol ($p=0,001$). Kesimpulan : Latihan dengan tongkat meningkatkan kecepatan jalan dengan cara meningkatkan Cadence, Step length, Stride length, menurunkan Stride width.

<hr>

Objective : To know the effect of a cane in Hemiplegics Gait Pattern.

Design : Pre- and post treatment with a control group

Subject : 40 people with hemiplegics stroke were divided into 2 groups with Randomized Permutation Block.

Setting : At Department of Physical Medicine and Rehabilitation Perjan. Dr. Hasan Sadikin Bandung.

Intervention : Intervention group walks with Cane, and control group is given gait training without assistive device. Exercise was given 3 times a day and four weeks. Patient walked with or without cane on distance was limited by the patient her or him self.

Parameters :Speed velocity, cadence, step length, stride length, stride width.

Result : There were significant differences between the intervention group compared with the control group : Speed velocity (p:0,031) increased at 4 th weeks, cadence (p: 0,037) increased at 3th weeks, step length (p: 0,025) increased at 3th weeks, stride length (p: 0,016) increased at 3th weeks, stride width (p: 0,002) decrease at 2 th weeks. There was also changes in cadence which was significant different between the intervention group (p: 0,000) and control group (p: 0, 002), step length was significantly different between intervention group (p: 0,000) and control group (p: 0, 001), stride length was significantly different between intervention group (p: 0, 000) control group (p: 0,616) ,stride width was significantly different between intervention group (p:0,000) and control group (p: 0,002), speed velocity was significantly different between intervention group (p: 0,000) and control group (p: 0, 001).

Conclusion : Exercise with a cane increased Speed velocity by increasing cadence, step length, stride length, and decreased stride width.