

Penelitian pendahuluan modifikasi diet ketogenik klasik sebagai terapi epilepsi intractabel

Eka Nurfitri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=108910&lokasi=lokal>

Abstrak

Nutrisi merupakan salah satu faktor lingkungan hidup sebagai kebutuhan dasar yang sangat penting untuk anak. Nutrisi dibutuhkan setiap hari tanpa dapat ditangguhkan ke hari esok untuk kelangsungan hidup maupun tumbuh kembang anak.

Selama ini pengetahuan tentang nutrisi sebagian besar membicarakan komponen diet, penyakit yang berhubungan dengan kekurangan gizi dan jumlah yang diperlukan untuk mencegahnya. Pada dekade terakhir timbul pemikiran bahwa nutrisi dapat berlaku sebagai "pengobatan". Diet tertentu bukan hanya merupakan obat bagi beberapa kelainan inborn error of metabolisme seperti fenilketonuria, homosistinuria, dan galaktosemia, tetapi juga sebagai terapi penyakit lain. Salah satunya adalah diet ketogenik sebagai terapi epilepsi intractabel.

Angka kejadian epilepsi pada anak dan remaja berkisar antara 50 - 100 per 100.000 penduduk pertahun. Di Inggris, 20 - 70 kasus per 100.000 populasi pertahun dengan prevalensi 4 - 10 kasus per 1000 populasi. Di Bagian Ilmu Kesehatan Anak FKUI - RSCM. terjadi peningkatan cukup berarti, dari 65 kasus baru dan 343 kasus epilepsi lama pada tahun 2000 menjadi 116 kasus epilepsi baru dan 356 kasus epilepsi lama pada tahun 2001.

Obat anti epilepsi (OAE) merupakan pilihan terapi pertama dan berhasil baik pada sebagian besar penderita anak, tetapi lebih dari 25% diantaranya menderita epilepsi intractabel atau kejang tidak terkontrol. Di Indonesia angka kejadian epilepsi intractabel belum tercatat, diperkirakan tidak berbeda jauh dengan penelitian di luar negeri. Diet ketogenik dapat menjadi alternatif terapi epilepsi intractabel. Variabel lama diet ketogenik adalah rasio ketogen dan non ketogen, yaitu rasio lemak dengan protein ditambah karbohidrat.