

**Pengaruh pemberian strain nostoc BAD5, GIA13a, dan TAB7d terhadap pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman padi (oryza sativa L.) varietas Ciherang = The effect of nostoc BAD5, GIA13a, dan TAB7d to vegetative and generative growth of Ciherang varieties of rice (oryza sativa L.)**

Anggi Septiani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20227946&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian strain Nostoc terhadap pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman padi (*Oryza sativa L.*) varietas Ciherang. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan enam ulangan dan empat perlakuan. Perlakuan terdiri atas pemberian strain Nostoc BAD5, GIA13a, TAB7d, dan kontrol. Pemberian strain Nostoc dilakukan ketika padi berumur 15, 30, 45, dan 60 hari setelah tanam (hst). Biomassa berat basah strain Nostoc yang diberikan pada 15 dan 30 hst masing-masing sebesar 0,4 g dan biomassa berat basah strain Nostoc yang diberikan pada 45 dan 60 hst masing-masing sebesar 0,6 g. Hasil uji ANOVA ( $\alpha = 0,05$ ) menunjukkan bahwa pemberian strain Nostoc dapat menurunkan jumlah buah kosong. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemberian strain Nostoc dapat meningkatkan panjang akar dan jumlah buah isi (bernas), dengan uji Kruskal-Wallis ( $\alpha = 0,05$ ). Perlakuan GIA13a terbukti paling baik dalam menurunkan jumlah buah kosong, meningkatkan panjang akar dan jumlah buah isi, dengan uji LSD ( $\alpha = 0,05$ ).

.....The experiment aim was to investigate the effect of Nostoc strains to vegetative and generative growth of Ciherang varieties of rice (*Oryza sativa L.*). The experiment used Randomized Completely Design with six replications dan four treatments. The treatments were applied by giving Nostoc strains BAD5, GIA13a, TAB7d, and control. Nostoc strains were inoculated at 15, 30, 45, 60 days after plantation (hst). Total of 0,4 g Nostoc biomass was inoculated at 15 and 30 hst, while 0,6 g Nostoc biomass was inoculated at 45 and 60 hst. The results of ANOVA test ( $\alpha = 0,05$ ) showed that inoculated of Nostoc strains had effect to decrease the number of filledout grains. The result of this experiment also had effect to increase the root length and number of filled grains, by Kruskal-Wallis test ( $\alpha = 0,05$ ). Strain of GIA13a proven the best treatment to decrease number of filled-out grains, increase root length and number of filled grains, by LSD test ( $\alpha = 0,05$ ).