

Faktor-faktor yang berhubungan dengan rendahnya cakupan Imunisasi TT ibu hamil

Asep Rusman, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20276184&lokasi=lokal>

Abstrak

Tujuan akhir program imunisasi dalam komitmen internasional adalah Eradikasi polio (ERAPO), Eliminasi Tetanus Neonatorum (RTN) serta reduksi campak. Pemanfaatan imunisasi TT ibu hamil pada tahun 1996 -- 1997 dari jumlah ibu hamil 5,1 juta adalah 73,3% (data : Subdit imunisasi Dirjen PPM dan PLP Depkes, 1998). Untuk cakupan imunisasi TT puskesmas Sukatenang adalah 79,5% dari target 95%, sedangkan cakupan imunisasi TT untuk desa Sukawangi adalah 73,8% dari target 95%.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya cakupan imunisasi TT, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan cross sectional. Sampel sebanyak 90 orang responden adalah ibu hamil ditahun 2004 menggunakan data primer dan sekunder, analisa data menggunakan dii statistik chi-square.

Variabel-variabel yang diteliti meliputi variabel independen yaitu faktor predisposisi (pendidikan ibu, umur ibu, pengetahuan ibu, dan sikap ibu), faktor pendukung (biaya dan jarak tempuh) dan faktor penguat (sikap petugas), variabel dependennya adalah cakupan imunisasi TT ibu hamil.

Dari hasil analisa data didapatkan bahwa ada hubungan yang bermakna yaitu variabel pendidikan ibu (p value = 0,004), umur ibu (p value - 0,027), pengetahuan ibu (p value = 0.1348) dan jarak tempuh (p value = 0,021). Sedangkan yang tidak bermakna adalah sikap ibu (p value = 0,112), biaya (p value = (3,175) dan sikap petugas (p value = 0,1000).

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan bahwa perlu diadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai posyandu yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat mau memanfaatkannya.