

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku klien NAPZA untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20276265&lokasi=lokal>

Abstrak

Pada saat ini telah dirasakan banyaknya permasalahan yang ada pada generasi muda seperti lawuran, sek bebas, NAPZA. Menurut Wibisono (2001) bahwa masalah penyalahgunaan zat (narkotika, alkohol, beberapa jenis psikotropika dan zat adiktif lain). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku klien NAPZA untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan. Ada dua faktor yang diteliti yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern terdiri dari jenis ras, jenis kelamin, sifat fisik, sifat kepribadian, bakat bawaan, dan intelegensi. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari lingkungan, pendidikan, agama, sosial ekonomi, dan kebudayaan.. Penelitian ini dilakukan pada 28 responden dengan menggunakan desain penelitian deskriptif eksploratif dan pengambilan sampel digunakan teknik purposive sampling. Penelitian dilakukan di Pamardi Siwi pada tanggal 31 Desember 2002 sampai dengan 2 Januari 2003. Dari hasil penelitian didapatkan faktor yang mempengaruhi perilaku klien NAPZA untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan yaitu dari faktor ekstern yang dominan terdiri dari agama (beribadah dan berada di tempat suci sebanyak 96,4 %), lingkungan (orang tua yang sering marah 82% dan teman-teman yang mengajak memakai 84,3%), dan sosial ekonomi (besar atau kecilnya uang saku 74,9%). Sedangkan dari faktor intern yang dominan terdiri dari intelegensi (sifat lambat mengambil keputusan dan lambat dalam melaksanakan 89,3 %), dan sifat kepribadian (mudah putus asa 82,1% dan mudah bergaul sebanyak 71,4%). Dari penelitian disimpulkan bahwa faktor ekstern lebih banyak mempengaruhi klien NAPZA untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan dibandingkan dengan faktor intern. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan menjadi pelajaran bagi instansi kesehatan, orangtua, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, yayasan terkait untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi klien NAPZA untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan, dan juga diharapkan bagi yang terkait diatas bisa meningkatkan sarana atau kondisi yang mendukung untuk faktor-faktor yang terkait terutama yang dominan.