

Gambaran hasil pengobatan pada penderita tuberkulosis paru dengan menggunakan strategi Directly Observed Treatment Short Cause (DOTS) di Puskesmas Beji, kota Depok pada Tahun 2005

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20276332&lokasi=lokal>

Abstrak

Menurut laporan WHO (1999) diperkirakan di Indonesia setiap tahunnya ditemukan 583.000 penderita tuberkulosis paru dengan kematian sekitar 140.000 penderita. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran hasil pengobatan pada penderita tuberkulosis paru dengan menggunakan strategi Directly Observed Treatment Short Cause (DOTS) di Puskesmas Beji Kota Depok pada tahun 2005. Desain yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif sederhana, cross sectional dan melihat distribusi iiekuensi angka kesembuhan dengan menggunakan kuisisioner. Hasil dari penelitian ini pengobatan pada 26 orang penderita tuberkulosis paru dengan menggunakan strategi DOTS di Puskesmas Beji Kota Depok tahun 2005 adalah angka kesembuhan 22 orang atau 84,62%. Penderita yang meninggal 2 orang atau 7,69%, sedangkan yang pengobatan lengkap ada 2 orang atau 7,69%. Penelitian ini merekomendasikan penelitian dengan menggunakan analisa bivariat atau multivariat untuk mengetahui keterkaitan faktor internal dan eksternal dari penderita tuberkulosis paru dengan angka kesembuhan.