

Gambaran sumber-sumber stres pada pasien yang menjalani terapi Hemodialisa di Rumah Sakit PGI Cikini Jakarta

Purba, Betty, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20276369&lokasi=lokal>

Abstrak

Pasien dengan hemodialisa (HD) memerlukan jangka waktu yang lama dalam terapinya yang memungkinkannya untuk menjadi stres. Stres dapat bersumber dari internal dan eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran sumber- sumber stres pada pasien yang menjalani terapi hemodialisa di RS. PGI. Cikini. Desain yang digunakan adalah desain deskriptif sederhana. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat, dimana jumlah responden sebanyak 53 orang, pasien hemodialisa diminta untuk menjadi responden dan mengisi kuesioner penelitian. Dari hasil analisis didapat sumber internal yang mempengaruhi timbulnya stres pada pasien yang menjalani terapi hemodialisa yaitu yang berusia 35-39 tahun dan 45-49 tahun (18,9%), pendidikan SLTA (37,7%], kepercayaan yang baik (64,2%), emosi yang baik (50,9%), hidup penuh arti (54,7%), tingkat pengetahuan yang baik (50,9%). Sumber eksternal yang mempengaruhi timbulnya stres pada pasien yang menjalani terapi hemodialisa yaitu dukungan keluarga (75,5 %), dukungan sosial (54,7 %), status ekonomi yang memadai (54,7%).