

## Hubungan tingkat nyeri post partum dengan motivasi ibu untuk melakukan bonding attachment

Ana Rizana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20276689&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Setiap ibu postpartum mengalami nyeri. Nyeri postpartum dapat disebabkan oleh robekan perineum, episiotomi, kontraksi, ketegangan buah dada, hemoroid, sakit kepala maupun karena tindakan cesarian. Nyeri merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi motivasi ibu untuk kontak awal dengan bayinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana hubungan antara tingkat nyeri postpartum dengan motivasi ibu untuk melakukan bonding attachment. Penelitian dilakukan di RSCM IRNA A lantai II kiri dan kanan dengan kriteria sampel ibu yang melahirkan secara sesarian dan primipara yang melahirkan secara normal. Sampel yang diambil 21 orang dan desain penelitiannya menggunakan deskriptif korelasi dengan metode analisisnya korelasi tata jenjang Spearman's. Hasil penelitian yang diperoleh ( $r_s=0.199 < 0.450$ ) pada taraf kepercayaan 95%. Ini berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat nyeri postpartum dengan motivasi ibu untuk melakukan bonding attachment.