

Tingkat pengetahuan remaja pengguna NAPZA tentang Hepatitis C di ruang rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20277341&lokasi=lokal>

Abstrak

Hepatitis C adalah infeksi sistemik yang disebabkan oleh Virus Hepatitis tipe C disertai nekrosis dan inflamasi pada sel hati (Brunner & Suddart, 2002). Penyakit ini ditularkan melalui darah dan komponen darah karena penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Penyakit hepatitis C ini sangat berbahaya karena dapat menjadi hepatitis kronis, sirosis hati, dan kanker hati primer. Diketahui penyakit ini banyak terjadi pada pengguna narkoba, karena 70% pengguna NAPZA dan obat-obat terlarang dilakukan melalui suntikan (Ashadi, T (2001). Sebagian besar pengguna NAPZA tersebut adalah kelompok remaja dan dewasa muda. Penelitian ini ingin mendapatkan gambaran tentang tingkat pengetahuan remaja pengguna NAPZA tentang Hepatitis C. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif sederhana dengan populasi semua remaja yang dirawat di ruang rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor dengan teknik total sampel, yaitu sebanyak 45 orang. Data dikumpulkan pada hari jumat 17 Desember 2004 dengan menggunakan kuisioner. Data diolah dengan menggunakan metode statistik sederhana dan ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi dan proporsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan remaja pengguna NAPZA di ruang rehabilitasi NAPZA Rumah Sakit Marzuki Mahdi adalah cukup, yaitu 24 orang (54%), Sedangkan tingkat pengetahuan baik ada 11 orang (24%) dan kurang 10 orang (22%)