

# Pengaruh latihan range of motion (ROM) ankle terhadap proses penyembuhan ulkus kaki diabetik di RSUD Dr. Hi. Abdul Moeloek dan RSUD Jendral A. Yani Propinsi Lampung

Ihsan Taufiq, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20281441&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Ulkus kaki diabetik adalah komplikasi kronik diabetes melitus yang mengakibatkan kerusakan kulit yang dapat meluas ke tendon, otot, tulang atau persendian. Ulkus kaki, infeksi, neuroarthropati dan penyakit arteri perifer mengakibatkan gangren dan amputasi ekstremitas bagian bawah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh latihan ROM ankle terhadap proses penyembuhan ulkus kaki diabetik di rumah sakit di propinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen pre post test dengan kelompok kontrol, melibatkan 7 responden kelompok intervensi dan 7 responden kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel dengan non probability consecutive sampling.

Penelitian ini menggunakan t test, diperoleh hasil adanya perbedaan yang signifikan rata-rata skor penyembuhan ulkus kaki diabetik antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol setelah dilakukan latihan ROM ankle ( $p = 0,001$ ;  $= 0,05$ ). Demikian juga terbukti tidak ada hubungan antara lama sakit DM ( $p = 0,656$ ;  $= 0,05$ ), GDN ( $p = 0,648$ ;  $= 0,05$ ), GDPP ( $p = 0,883$ ;  $= 0,05$ ) dan infeksi ulkus ( $p = 1,000$ ;  $= 0,05$ ) dengan skor penyembuhan ulkus kaki diabetik.

Peneliti memberikan saran agar latihan ROM ankle dapat diterapkan pada perawatan ulkus kaki diabetik sesuai dengan formula yang ada. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dengan jenis gerakan yang lain, melibatkan tidak hanya sendi ankle. Selain itu dilakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar. *<hr><i>Diabetic foot ulcer is a chronic complication of diabetes melitus disease resulting in destruction of skin that can spread to tendons, muscles, bones or joints. Foot ulcers, infections, neuroarthropati and peripheral arterial disease lead to gangrene and amputation of the lower extremities. The purpose of this study was to determine the effect of ankle ROM exercises on the healing of diabetic foot ulcers in the hospital province of Lampung. This study used quasi-experimental design pre-post test with control group. This study recruited 7 respondents intervention group and 7 respondents control group by non probability consecutive sampling.*

The t test result showed that there was a significant difference in the mean score of the healing of diabetic foot ulcers between the intervention and control group after ankle ROM exercise ( $p = 0.001$ ;  $= 0.05$ ). There are no relationship among the illness period of DM ( $p = 0.656$ ;  $= 0.05$ ), GDN ( $p = 0,648$ ;  $= 0,05$ ), GDPP ( $p = 0,883$ ;  $= 0,05$ ) and ulcers infection ( $p = 1.000$ ;  $= 0,05$ ) with a score of healing diabetic foot ulcers. The researcher suggested that ankle ROM exercises could be applied to the diabetic foot ulcers care in accordance with the existing formula. Further research needs to be done with other types of movement, involving not only the ankle joint, but also other parts of joints. In addition the study should be recruited a larger number of samples.</i>