

Perubahan status gizi pada anak balita gizi kurus yang mengikuti pemulihan gizi buruk di klinik gizi PTTK dan EK

Dwi Anggraeni Puspitasari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20289812&lokasi=lokal>

Abstrak

Prevalensi gizi kurus di Propinsi Jawa Barat pada tahun 2010 tergolong tinggi sebesar 11,0%. Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik mempunyai klinik pemulihan gizi secara rawat jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan status gizi balita gizi kurus yang mengikuti pemulihan gizi buruk secara rawat jalan selama tiga bulan dan faktor-faktor yang berhubungan dengan perubahan status gizi anak balita. Jenis penelitian yang digunakan kuasi eksperimen before and after jumlah sampel sebanyak 75 anak balita gizi kurus, yang mengikuti paket pemulihan gizi selama tiga bulan menggunakan data sekunder PTTK dan EK tahun 2006-2010.

Hasil penelitian ini terjadi perubahan status gizi balita kurus menjadi normal selama 3 bulan mengikuti pemulihan sebesar 58,7% dan yang turun menjadi sangat kurus sebesar 2,7% dari jumlah sampel 75 anak balita usia 6-59 bulan. Setelah dilakukan uji statistik ada hubungan yang bermakna antara pekerjaan orangtua dengan perubahan status gizi ($p=0,009$), dan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara karakteristik anak (umur, jenis kelamin, nomor urut kelahiran), karakteristik keluarga (umur ibu, pendidikan orangtua, pekerjaan ayah, jumlah anggota rumah tangga), penyakit infeksi, kepatuhan dalam mengikuti jadwal kegiatan dengan perubahan status gizi.

.....Prevalence of underweight malnutrition in West java in 2010 is high at 11%. Applied technology centers and health clinics have clinical epidemiology of malnutrition recovery on an out patient basis. The study aims to determine the nutritional status of bony changes that follow. The nutritional recovery on an outpatient basis for three months and the factors associated with changes in nutritional status of children under five. This type of research used quasi experimental before and after a sample of 75 children under five under weight malnutrition, which followed the nutritional recovery package for three months by using a secondary data and EK PTTK 2006-2010.

The result of this study changes in nutritional status of children under weight to normal during the 3 months following the recovery of 58,7%, and that drops to a very thin at 2,7% of the total sample 75 toddlers ages 6-59 months. Having performed statistical test are meaningful relationship between their parents job to change the nutritional status ($p=0,009$), and there is no meaningful relationship between child characteristic (age, sex, serial number of births), family characteristics (maternal age, parental education, father's work, the number of household), infectious diseases, compliance in the following schedule of activities with changes in nutritional status.