

Studi polinasi dan populasi amorphophallus variabilis Bl. di kawasan Universitas Indonesia, Depok

Adhitia Pratama, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20292135&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Kawasan Kampus Univesitas Indonesia merupakan habitat alami bagi tumbuhan *Amorphophallus variabilis* Bl. Pengamatan dilakukan di 6 (enam) lokasi di Kawasan Universitas Indonesia untuk mengetahui pola penyerbukan (polinasi) dan populasi A.

variabilis Bl. Berdasarkan hasil penelitian, penyerbukan A. variabilis terjadi 3 hari setelah mekarnya spatha pada pertbungaan. Polinasi kemudian diikuti dengan fase pematangan buah yang terjadi selama 15 hari. Serangga yang berperan sebagai penyerbuk antara lain dari suku Nitidulidae, Endomychidae, Anthomyiidae, dan Tachinidae. Terdapat hubungan antara morfologi pertbungaan dengan jumlah individu serangga yang berkunjung. Pola sebaran populasi A. variabilis di 6 (enam) lokasi penelitian menunjukkan pola yang mengelompok. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara lokasi dengan karakter morfologi A. variabilis. Dominansi berkisar antara 0.01--0.06 frekuensi antara 0.2--0.4, dan jumlah individu / m² berkisar antara 0.13--0.2 . Tinggi tumbuhan berkisar antara 5.2--160 cm dengan diameter 0.05--2.3 cm dengan berbagai variasi morfologi pada bagian pertbungaan seperti osmofor, spatha, dan petiolus.

<hr>

ABSTRACT

University of Indonesia Campus area is a natural habitat for *Amorphophallus variabilis* Bl. Observations were carried out in 6 locations in the Area, University of Indonesia to find out the pattern of pollination (pollination) and population of *A. variabilis* Bl. Based on the results of research, pollination *A. variabilis* occurred 3 days after blooming spatha on the inflorescence. Pollination followed by fruit ripening phase that occurred during the 15 days. Insects that act as pollinators, such as from the tribe of Nitidulidae, Endomychidae, Anthomyiidae, and Tachinidae. There is a relationship between the morphology of the inflorescence with the number of individuals visiting insects. *A. variabilis* population distribution pattern in 6 (six)

locations showed a clumped pattern. There was no significant effect between site and morphological characteristics of *A. variabilis*. Dominance ranged from 0,01 to 0,06, frequencies between 0,2 - 0,4, and the number of individuals / m² ranged between 0,13--0,12. Plants high ranged from 5,2 - 160 cm with a diameter of 0,05 - 2,3 cm

with a variety of inflorescence morphology in sections like osmophores, spathes, and petioles.