

Faktor faktor yang berhubungan dengan kejadian infeksi Gonore pada wanita penjaja seks komersial di 16 Kabupaten/Kota Indonesia (analisa data Sekunder Survei Terpadu Biologi dan Prilaku 2011)

Nurhalina Afriana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20303165&lokasi=lokal>

Abstrak

Latar Belakang : Gonore adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh *Neisseria gonorrhoeae* yang menginfeksi lapisan dalam uretra, leher rahim dan rectum. Pada wanita Gonore bisa naik ke saluran kewanitaan menginfeksi selaput di dalam panggul sehingga 40% timbul nyeri panggul dan gangguan reproduksi serta menjadi faktor risiko penting dalam transmisi HIV (Kemkes RI). Di Indonesia gonore merupakan jenis IMS yang tertinggi berdasarkan data yang ada pada WPS. Prevalensi Gonore pada WPS 49% (IBBS 2007), Gonore merupakan indikasi biologis tentang perilaku seks berisiko dan banyak terjadi di industri seks komersial Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kejadian infeksi gonore pada WPS yaitu umur, pendidikan, lama menjadi WPS, Masa kerja, Umur pertama hubungan sek, pemakaian kondom dan status HIV.

Metode : Desain penelitian ini adalah potong Lintang. Data diperoleh dari Survey Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) tahun 2011. Data dianalisis secara bivariat untuk mendapatkan nilai Crude Odds Ratio dari faktor yang berhubungan dengan infeksi gonore, serta analisis multivariate untuk melihat variabel paling dominan kejadian infeksi gonore dilihat dari nilai Adjusted Odds Ratio.

Hasil : faktor yang berhubungan dengan infeksi gonore. umur OR (0,95%CI); 1.41 (1.98 ? 1,65), jumlah pelanggan OR (0,95%CI);1.29 (1.09 ? 1.51) , lama menjadi WPS OR (0,95%CI); 1.36 (1.15 ? 1.59) dan status HIV OR (0,95%CI); 1.72 (1.33 - 2.22) merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan kejadian infeksi gonore.

.....Background : Gonorrhoea is a sexually transmitted disease caused by *Neisseria gonorrhoeae* that infects the inner lining of the urethra, cervix and rectum. In women gonorrhoea can infect the genital tract up to the membrane in the pelvis so that the 40% and pelvic pain and reproductive problems as well as being an important risk factor in HIV transmission (Kemkes RI). In Indonesia, gonorrhoea is the highest type of STI prevalence data based on 49% of gonorrhoea in the FSW (IBBS 2007), Gonorrhoea is considered as an indication of biological resources in risky sexual behavior and still a lot happening in the commercial sex industry The aim of this study to determine factors associated with the incidence of gonorrhoea infection in the FSW: age, education, length of work FSW, number of client, age at sex debut, condom use, HIV status.

Methods : The study design is cross sectional. Data was obtained from Integrated Biological and Behaviour Survey (IBBS) in 2011. Data in the bivariate analysis to obtain the value of Crude Odds Ratio of factors associated with gonorrhoea infection, and multivariate analysis to see the most dominant variable incidence of gonorrhoea infection in view of the Adjusted Odds Ratio.

Results : The factors related with gonorrhoea infection. age OR1.41 0.95% CI 1.98 - 1.65), number of clients OR 1.28 95%CI 1.09 ? 1.51), length of work FSW OR 1:26 0.95% CI 1.15 to 1.59 and HIV status OR 1.72 0.95% CI 1:33 to 2:22 is the most dominant factor related with the incidence of gonorrhoea infection.