

## Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Terapi Penderita Karsinoma Laring di Bagian THT FKUI/RSCM periode 1992-1996

Dini Widiarni, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20316607&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Karsinoma laring merupakan keganasan didaerah Iaring dengan insidensi berbeda didunia. Di Bagian THT RSCM karsinoma laring menempati urutan ketiga setelah karsinoma nasofaring dan tumor ganas hidung dan paranasal. Penatalaksanaan terdiri dari operasi laringektomi dengan atau tanpa diseksi leher, radiasi, kemoterapi atau kombinasi tergantung dari stadium. Dilakukan studi kohort untuk mengevaluasi keberhasilan terapi, efek yang terjadi serta saat terjadinya efek. Bagaimana keberhasilan terapi karsinoma Iaring dan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan operasi merupakan pertanyaan yang ingin dijawab pada penelitian ini.

<br /><br />

Periode 1992-1996 jumlah karsinoma laring 82 kasus, 12 % dan seluruh keganasan dibidang THT. Karakteristik penderita dianalisis dari 80 kasus. Ungkat survival dianalisis dari 60 penderita yang dapat diikuti selama 1 tahun. Analisis data univariat menggunakan Kaplan Meier, analisis bivariat menggunakan log rank test dan multivariat menggunakan cox regresi.

<br /><br />

Hasil analisis survival, jumlah rokok, adanya metastasis jauh dan stadium tumor akan meningkatkan risiko terjadinya kematian dengan confidence interval bermakna. Rokok, kelenjar Iimf leher akan meningkatkan risiko terjadinya residif dengan confidence Interval bermakna. Tingkat survival keseluruhan 67.4% pada hari ke 914 hari. Bebas residif 34.6% pada 978 hari dengan median survival 519 hari. Tingkat survival stadium I 100%, stadium II 100% , turun 50% pada hari ke519. Stadium III tingkat survival 41.1% dengan median survival 480 hari, stadium IV tingkat survival 23.3%.