

Hubungan koping individu dengan tingkat kepatuhan penyandang Diabetes Mellitus sebagai anggota Persadia cabang RSMM Bogor = Relationship between individual coping and adherence rate in Diabetes Mellitus suffered people as Persadia member RSMM Bogor

Firman Hidayat, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20337111&lokasi=lokal>

Abstrak

Koping individu yang efektif diperlukan bagi penyandang DM untuk meningkatkan kepatuhan penyandang DM dalam mengelola penyakitnya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan karakteristik, tingkat kepatuhan dengan koping individu penyandang DM sebagai anggota Persadia RSMM Bogor. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancangan cross sectional dengan jumlah responden 88 penyandang DM, dengan uji statistik Chi square dan uji t independen.

Hasil penelitian didapatkan bahwa karakteristik responden tidak ada hubungan dengan tingkat kepatuhan kecuali usia (p value 0.043; α 0.05) dan jenis kelamin (p value 0.044; α 0.05), ada hubungan koping individu dengan tingkat kepatuhan (p value 0.037; α 0.05). Karakteristik responden tidak ada hubungan dengan koping individu. Diharapkan perawat dapat meningkatkan kepatuhan dan koping individu penyandang DM menjadi efektif dengan memberikan pendidikan kesehatan terstruktur, memfasilitasi pemberian dukungan sosial dan memberikan intervensi seperti coping enhancement, teaching, self-awareness, dan self-efficacy enhancement. untuk mencegah terjadinya koping individu yang tidak efektif dan ketidakpatuhan.

<hr>

Effective individual coping is required for people with diabetes to improve the adherence to manage the disease. The purpose this study was to identify the relationship between characteristics and individual coping with levels of adherence diabetes mellitus as member of Persadia RSMM Bogor. The design of this research was correlational with cross sectional approach. The sample of this study consisted 88 number with DM. Data was analysed using χ 2 and independence t test.

The result revealed that there was no relationship between characteristics and adherence rate, except age (p value 0.043; α 0.05) and gender (p value 0.044; α 0.05). There was a relationship between individual coping and adherence rate (p value 0.037; α 0.05). There was no relationship between characteristics with individual coping. Nurses are recommended to improve adherence and coping individuals with diabetes, to be effective, by providing a structured health training, social support, and facilitate the provision of interventions to prevent individual ineffective coping and unadherence.