

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kematian ibu karena pre eklampsia berat di RSUD Tangerang tahun 2005-2008

Lusi Widiastuti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20338315&lokasi=lokal>

Abstrak

Pre eklampsia adalah kondisi yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah dan proteinuria yang nyata pada ibu hamil. Pre eklampsia dan eklampsia menjadi salah satu penyebab kematian terbanyak di rumah sakit dengan persentase kasus sekitar 30%.

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah mencari faktor-faktor, yang berhubungan dengan kematian pada ibu dengan pre eklampsia berat di RSUD Tangerang. Faktor terbagi menjadi 3 kategori yaitu faktor ibu (umur, padmas, riwayat abortus, riwayat dm, riwayat hipertensi, dan riwayat hipertensi dalam keluarga), faktor penanganan pra rumah sakit (perujuk, penatalaksanaan pra rs dan lama waktu merujuk) dan faktor penanganan di rumah sakit (pemberian obat perawatan di ICU cara dan waktu terminasi kehamilan dan komplikasi).

Metode: Desain penelitian adalah kasus kontrol. Kasus adalah ibu yang meninggal karena pre eklampsia berat, dan kontrol adalah ibu pre eklampsia berat yang bertahan hidup. Sampel penelitian terdiri dari 73 kasus dan 73 kontrol. Data diambil dengan menggunakan kuesioner berdasarkan informasi yang disarikan dari data rekam medis pasien 2005-2008.

Hasil: Faktor-faktor yang berhubungan dengan kematian pada ibu dengan pre eklampsia berat di RSUD Tangerang adalah riwayat hipertensi dalam keluarga ($p=0,013$, OR 0,147; 95 % CL 0,032-0,684). Pemberian obat di Rumah Sakit rangkaian tindakan penanganan pra rumah sakit dan selama di rumah sakit (continuum of care). Keberhasilan penanganan komplikasi tidak terlepas dari rangkaian kegiatan, yang diharapkan sejak awal patuh pada prosedur tata laksana yang ada, sekaligus didukung dengan kesiapan fasilitas kesehatan (rumah sakit) dalam menangani kasus.