

Faktor-faktor yang mempengaruhi Anoreksia pada pasien yang dirawat di rumah sakit

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20340205&lokasi=lokal>

Abstrak

Hasil survey yang dilakukan di RSUPN Cipto Mangunkusumo menunjukkan 35,2 % pasien pasien yang dirawat tidak menghabiskan makanan yang disediakan rumah sakit, 47 % diantaranya hanya menghabiskan 1/4 porsi, 15 % menghabiskan 1/2 % porsi dari 38 % menghabiskan 3/4 porsi (Sri Redjeki, 2001).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif sederhana yaitu ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi anoreksia pada pasien yang dirawat di rumah sakit dengan menggunakan metode pengambilan sampel "Accidental Sampling" yaitu pengambilan responden yang kebetulan ada atau tersedia. Pengambilan sample dilakukan di RSUP Fatmawati Ruang Penyakit Dalam Pria dan wanita.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Instrumen berupa kuesioner dengan menggunakan skala Likert dengan pilihan Sangat Setuju, Setuju, Kurang Setuju dan Tidak setuju yang kemudian diberi rentang nilai 1 s.d 5.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan dari 30 responden ternyata faktor pola makan mendapatkan nilai rata-rata 2,8 disusul dengan faktor cara penyajian makanan nilai rata-rata 2,5 dan faktor lingkungan 2,2. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan nilai rata-rata standar dengan hasil yaitu $X > 3$ berpengaruh dan $X < 3$ berarti tidak berpengaruh.