

Faktor yang mempengaruhi klien Hemodialisa kurang mematuhi pembatasan cairan sesuai anjuran medik di RS PGI Cikini

Sijabat, Resmin, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20342983&lokasi=lokal>

Abstrak

Problematik klinik sering dijumpai dimana klien Hemodialisa kurang mematuhi pembatasan cairan sesuai anjuran medik . Hal ini merupakan penyebab peningkatan angka komplikasi yang ditandai dengan peningkatan frekwensi pernafasan, nadi dan tekanan vena sentral, sesak, edema dan batuk bahkan sampai mengancam nyawa klien. Melihat fenomena ini maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor yang mempengaruhi klien Hemodialisa kurang mematuhi pembatasan cairan yang dianjurkan medik.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif sederhana dengan 30 responden. di RS PGI Cikini Jakarta, selama 3 minggu dengan menggunakan alat pengumpulan data kuisisioner yang dibagi dalam 3 bagian besar yaitu 1 kebutuhan cairan dengan temuan 43 %, motivasi sebanyak 30 % dan sikap perilaku perawat dalam membenkan pendidikan kesehatan 27 %. Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi klien Hemodialisa kurang mematuhi pembatasan cairan sesuai anjuran medik. Untuk mengoptimalkan kondisi kesehatan klien Hemodialisa, perawat harus memiliki kemampuan pengetahuan yang tinggi dalam meningkatkan motivasi klien dapat melakukan manajemen cairan sesuai anjuran medik secara mandiri.