

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Ketidapatuhan pada Pengguna Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA) Suntik yang Mengikuti Program Terapi Rumatan Metadon di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur Jakarta Timur Tahun 2013 = Factors Associated with Noncompliance of Injection Drug Users (IDU) who Follow Methadone Maintenance Treatment Program in RSKO Cibubur East Jakarta

Putri Immi Rizky Budiyani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20346376&lokasi=lokal>

Abstrak

Maraknya penyalahgunaan NAPZA suntik, membuat pemerintah mendirikan Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) untuk mengurangi dampak buruk akibat pemakaian NAPZA suntik, sehingga diharapkan meningkatnya derajat kesehatan penasun. Namun salah satu permasalahan dalam penerapan PTRM adalah kepatuhan pasien. Berdasarkan hal itu, dilakukan penelitian cross sectional terhadap 51 sampel agar diketahui faktor yang berhubungan dengan ketidapatuhan mengikuti terapi metadon di RSKO Cibubur. Hasil penelitian menunjukkan ketidapatuhan sebesar 37,3%. Diketahui penasun dengan umur <30 tahun (66,7%), berjenis kelamin laki-laki (40%), pendidikan tinggi (37,5%), tidak bekerja (44,4%), pengetahuan kurang (54,5%), sikap kurang (60%), jauh dari tempat pelayanan (38,7%), dukungan keluarga kurang (46,7%), dukungan petugas kesehatan kurang (50%), dukungan teman kurang (37,5%) dan keterpaparan informasi baik (41,7%) memiliki proporsi ketidapatuhan lebih tinggi. Hasil uji Chi Square menyatakan terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan ketidapatuhan mengikuti PTRM (p-Value 0,026; PR 2,261).

.....

The rise of injecting drug use make government build Methadone Maintenance Treatment program (MMT), in order to harmful reduction so that IDU's health increased. But one of problems in applying MMT is adherence injection drug users. Based on that, cross sectional study carried out to 51 samples in order to know the factors related to disobedience in IDU who following MMT program in RSKO Cibubur.

The result shows disobedience is 37,3%. IDU with age less than thirty (66,7%), male (40%), high education (37,5%), didn't have a job (44,4%), less knowledge (54,5%), less attitude (60%), far from health care (38,7%), less of family support (46,7%), less of health worker's support (50%), less of friend support (37,5%) and have good exposure information (41,7%). Chi Square test results stated that there is a significant relationship between knowledge of the noncompliance following the MMT (p-Value 0.026; PR 2,261).