

Keberadaan larva aedes pada container dalam rumah di Rw 03 dan Rw 07 Kelurahan Cempaka Putih barat setelah mendapat bacillus thuringiensis israelensis = The presence of aedes larvae in container inside the house in Rw 03 and Rw 07 Kelurahan Cempaka Putih barat after bacillus thuringiensis israelensis application

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20346637&lokasi=lokal>

Abstrak

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan masalah kesehatan yang masih menjadi ancaman bagi masyarakat di Indonesia, terutama di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat sehingga perlu dilakukan pemberantasan vektor DBD. Pemberantasan vektor DBD perlu ditekankan pada container dalam rumah karena tempat perindukan utama *Aedes aegypti* terletak di dalam rumah. Salah satu cara pemberantasan vektor DBD yang ramah lingkungan dan memiliki efek jangka panjang adalah dengan penggunaan *Bacillus thuringiensis israelensis* (Bti). Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat efektivitas penggunaan Bti pada Kelurahan Cempaka Putih Barat yang sebelumnya telah mendapat Bti. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui keberadaan larva *Aedes* pada container dalam rumah di RW 03 dan RW 07 Kelurahan Cempaka Putih Barat setelah mendapat Bti. Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional analitik. Pengambilan data dilaksanakan pada tanggal 25 April 2010 di Kelurahan Cempaka Putih Barat, yaitu RW 03 yang tidak mendapat Bti dan RW 07 yang mendapat Bti. Container dalam rumah yang paling banyak mengandung larva pada RW 03 dan RW 07 adalah bak mandi karena container bervolume besar disukai *Ae. aegypti*. Container dalam rumah yang positif larva pada RW 03 adalah 7% dan pada RW 07 adalah 5%, terdapat perbedaan tetapi tidak bermakna secara statistik ($p = 0,341$). Disimpulkan Pemberian Bti tidak berpengaruh terhadap keberadaan larva *Aedes* pada container dalam rumah di RW 03 dan RW 07 Kelurahan Cempaka Putih Barat.

<hr>

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a health issue that remains a threat to society in Indonesia, especially in the Cempaka Putih Barat, Central Jakarta thus dengue vector needs to be controlled. The eradication of dengue vectors should be emphasized in the containers inside the house because the main breeding site of *Aedes aegypti* is located inside the house. One of the dengue vector eradication methods which is environmentally friendly and has a long-term effects was the use of *Bacillus thuringiensis israelensis* (Bti). Therefore, this study would look the effectiveness of Bti application in Cempaka Putih Barat that had previously been received Bti. The purpose of this study was to determine the presence of *Aedes* larvae in containers inside the house in RW 03 and RW 07 Cempaka Putih Barat after Bti application. This study was a cross-sectional analytic study. The

data collection was conducted on April 25, 2010 in Cempaka Putih Barat, RW 03 where Bti was not applied and RW 07 where Bti was applied. Container inside the house which was the most widely-containing larvae in RW 03 and RW 07 was the bathtub because of a large-volume container preferred *Ae. aegypti*. Container inside the house that was positive larvae in RW 03 was 7% and RW 07 was 5%, there was the difference but it was not significant ($p = 0.341$). It was concluded that Bti didn't not affect the presence of *Aedes* larvae in containers inside the house in RW 03 and RW 07 Kelurahan Cempaka Putih Barat.