

Hubungan antara pengetahuan tentang arteri vena fistula cimino dan hemodialisa karakteristik klien gagal ginjal kronik dengan tingkat kecemasan menjalani hemodialisa di ruang renal unit Rumah Sakit PGI Cikini = The correlational between knowledge of arteriovenous fistula cimino and hemodialysis the characteristics of clients with chronic renal failure and anxiety level during hemodialysis at renal unit in Cikini Indonesia churches community Hospital

Ginting, Sri Melda Br, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20346885&lokasi=lokal>

Abstrak

Gagal ginjal kronik adalah suatu proses patofisiologis dengan etiologi yang beragam, mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif. Klien yang mengalami gagal ginjal kronik memerlukan alternatif terapi untuk mengganti fungsi ginjal. Salah satu alterantif terapi tersebut adalah hemodialisa, yang pelaksanaannya memerlukan sarana arteri vena fistula/cimino. Pada saat menjalani hemodialisa klien gagal ginjal kronik sering mengalami kecemasan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang arteri vena fistula/cimino dan hemodialisa, karakteristik klien gagal ginjal kronik dengan tingkat kecemasan menjalani hemodialisa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dari Halmilton Rating Scale for Anxiety (HRS-A) dan pengetahuan tentang arteri vena fistula/cimino dan hemodialisa. Analisis penelitian ini adalah univariat dan bivariat dengan uji chisquare.

Analisis bivariat menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat kecemasan ($p= 0,11 \geq 0,05$). Hasil penelitian ini diharapkan perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada klien dengan gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialisa sehingga pengetahuan meningkat dan tingkat kecemasan menerun.

<hr><i>Chronic renal failure (CRF) is a pathophysiological process with etiology, which cause decreasing in progressive kidney function. Clients with CRF need alternative therapy to replace the renal function. One of the alternative therapy is hemodialysis which needs arteriovenous fistula/cimino. During hemodialysis, clients with chronic renal failure often feel anxious.

This research aim to indentify the correlation between knowledge about arteriovenous fistula/cimino and hemodialysis, the characteristics of clients with chronic renal failure with anxiety level during the hemodialysis process. The technique used to collect the samples in this research was accidental sampling. Data was collect used Halmilton Rating Scale for Anxiety (HRS-A) questionnaires and questionnaire of knowledge about artery venous fistula/cimino and hemodialysis.

The analysis of this research are univariat and bivariat with chi-square. Bivariat analysis explain that there was no correlation between knowledge level and anxiety level ($p=0,39 \geq 0,05$). The result of this

research expected the nurses to give education for patients with chronic renal failure which undergo hemodialysis in order to increase their knowledge and decrease the anxiety level during hemodialysis.</i>