

Hubungan obesitas umum dan sentral dengan terjadinya Diabetes Mellitus tipe 2 : analisis data sekunder baseline studi kohor faktor risiko penyakit tidak menular di Kelurahan Kebon Kalapa Bogor tahun 2011 = Relationship of general and central obesity with the occurrence of type 2 Diabetes Mellitus : secondary data analysis on cohort study baseline of non communicable diseases risk factor in Kebon Kalapa Bogor Village year 2011

Made Dewi Susilawati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20349034&lokasi=lokal>

Abstrak

Kriteria utama obesitas menurut WHO adalah IMT namun obesitas sentral lebih berhubungan dengan risiko kesehatan dibanding obesitas umum Tujuan penelitian untuk mendapatkan cut off point dari ketiga indikator dalam mendeteksi terjadinya DMT2. Juga untuk mengetahui hubungan obesitas dengan indikator IMT, LP dan rasio LP-TB dengan terjadinya DMT2 dan menentukan indikator mana yang lebih baik dari ketiganya. Desain Cross Sectional. menggunakan data sekunder. Analisis menggunakan regresi logistic dan metode ROC.

Hasil : prevalensi DMT2 9,1% dan prevalensi obesitas berkisar 38,37 % - 41,98 % Nilai cut off obesitas umum IMT 25,72 kg/m², LP laki-laki 80,65 cm perempuan 80,85 cm dan LP-TB laki-laki 0,51 perempuan 0,55.

Kesimpulan : orang dengan obesitas meningkatkan risiko terjadinya DMT2 setelah dikontrol faktor umur. Karena hasil ketiga indikator tidak jauh berbeda, maka penggunaannya tergantung keputusan praktisi kesehatan itu sendiri.

.....The WHO's major obesity criteria is BMI but central obesity is more associated to health risks than general obesity. The objective of the research is to define the cut off points of the three measurements in detecting the occurrence of T2DM. It is also aimed to examine the relationship of obesity indicators (BMI, WC, and WHtR) with T2DM and determine the best indicator of them. Design of Cross Sectional employs secondary data. Analysis apply logistic model and ROC method.

The result: prevalence of type 2 DM is about 9.1%, and obesity prevalence is about 38.37 % to 41.98 %. The cut off values of BMI general obesity, male WC, female WC, male WHtR, and female WHtR are 25.72 kg/m², 80.65 cm, 80.85 cm, 0.5, and 0.55 respectively.

Conclusion: adjusted by age, obesity increases the risk of type 2 DM occurrence. Since there is no significantly different result, the use of obesity indicators depends on the health practitioner decisions.