

Analisis faktor yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan spiritual pada klien gagal jantung di ruang rawat inap / Erlin Ifadah

Erlin Ifadah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20350363&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK
Gagal jantung adalah kerusakan pompa jantung yang dimanifestasikan dengan pernafasan yang cepat, sesak pada saat beraktivitas, paroxysmal nocturnal dyspnea, orthopnea dan adanya edema perifer atau edema paru. Hal ini menyebabkan tingginya mortalitas dan morbiditas serta seringnya klien gagal jantung berulang kali keluar masuk rumah sakit. Pemenuhan kebutuhan pada klien gagal jantung bukan hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik atau psikologik, tetapi juga pemenuhan kebutuhan spiritualnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan spiritual klien gagal jantung di rawat inap yang meliputi faktor fungsi keluarga, kegiatan keagamaan, derajat gagal jantung, kecemasan dan depresi. Desain penelitian Cross Sectional dengan uji statistik Chi Square dilakukan untuk melihat hubungan tersebut. Pemodelan regresi logistik ganda digunakan untuk menentukan faktor yang paling berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan spiritual. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara fungsi keluarga (OR=5,700 dan nilai $p=0,001$), kegiatan keagamaan (OR=5,750 dan nilai $p=0,001$), derajat gagal jantung (OR 4,167 dan nilai $p=0,016$) dan depresi (OR=3,692 dan nilai $p=0,011$) dengan pemenuhan kebutuhan spiritual klien gagal jantung. Fungsi keluarga merupakan faktor dominan yang paling berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan spiritual (OR=0,229). Hasil penelitian menunjukkan fungsi keluarga mempunyai peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan spiritual klien gagal jantung, oleh sebab itu keluarga harus dilibatkan pada setiap asuhan keperawatan yang akan diberikan pada klien gagal jantung.

ABSTRACT
Heart failure is a heart pump damage manifested by rapid breathing, shortness on exertion, paroxysmal nocturnal dyspnea, orthopnea and peripheral edema or pulmonary edema. This leads to high mortality and morbidity of heart failure and frequent client repeatedly in and out of the hospital. Meeting the needs of the clients of heart failure is not only oriented to the physical or psychological needs, but also their spiritual needs. This study aims to analyze the factors related to the spiritual needs of clients in heart failure hospitalization factors include family functions, religious activities, the class of heart failure, anxiety and depression. Design Cross-sectional study with Chi Square statistical test conducted to see the relationship. Multiple logistic regression modeling used to determine the factors most related to spiritual fulfillment. The results showed an association between family functioning (OR = 5.700 and $p = 0.001$), religious activities (OR = 5.750 and $p = 0.001$), the class of heart failure (OR 4.167 and $p = 0.016$) and depression (OR = 3.692 and p -value = 0.011) with the spiritual needs of heart failure clients. Family function is the most dominant factor related to spiritual fulfillment (OR = 0.229). The results showed a family function has an important role in meeting the spiritual needs of the client

with heart failure, therefore the family should be involved in any nursing care that will be given to clients of heart failure.