

# Hubungan antara kandidiasis vulvovaginal dengan gonore serta faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pekerja seks komersial pekerja seks komersial di Kabupaten Kuningan Jawa Barat = Relationship between candidiasis vulvovaginal with gonorrhoeae and other associated factors among fsw female sex workers in Kuningan Jawa Barat

Risqon Nafiah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20385654&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Infeksi Saluran Reproduksi (Reproductive Tract Infections) telah menjadi masalah besar kesehatan Dunia, yang meliputi berbagai penyakit pada organ reproduksi baik infeksi endogen, Infeksi Menular Seksual, ataupun iatrogenik. Angka kejadian penyakit ini semakin meningkat dan menimbulkan berbagai komplikasi, sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius. Salah satu kelompok infeksi endogen yang banyak diderita oleh masyarakat adalah kandidiasis vulvovaginal, sedangkan kelompok Infeksi Menular Seksual yang juga banyak diderita adalah gonore. Kelompok masyarakat yang mempunyai resiko tinggi mengalami dan bahkan menularkan penyakit saluran reproduksi ini adalah PSK (Pekerja Seks Komersial), sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut pada kelompok ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kandidiasis vulvovaginal dengan gonore pada PSK, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Desain penelitian ini adalah potong lintang dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 265 PSK dan diambil di kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan bermakna antara kandidiasis vulvovaginal dengan gonore ( $p=0,02$ ). Faktor yang mempengaruhi koinfeksi kandidiasis vulvovaginal dan gonore adalah kontrasepsi hormonal ( $p=0,014$ ). Sedangkan faktor-faktor lain, yaitu usia ( $p=0,367$ ), tingkat pendidikan ( $p=0,223$ ), serta kondom ( $p=0,193$ ) tidak mempunyai hubungan yang bermakna. Diperlukan adanya edukasi dan promosi kesehatan kepada pada PSK, terutama mengenai penggunaan kontrasepsi yang benar.

<hr><i>Reproductive Tract Infections (RTI) present major health problems, which include endogenous infections, Sexually Transmitted Infections (STI), and also iatrogenic infections. These infections have increased incidence and can cause many complications, therefore we should give more concern about these infection. One of endogenous infections that has high prevalence among people is candidiasis vulvovaginal and one of Sexually Transmitted Infections that also has high prevalence is gonorrhoeae. Female Sex Workers (FSW) has higher risk to suffer and also spread RTI because they have multiple sex-partner. This study aims to find out relationship between candidiasis vulvovaginal and gonore among FSW and other associated factors. A cross-sectional study was used on a secondary data collected from 265 FSW in Kuningan, Jawa Barat. The result showed that there was significant relationship between candidiasis vulvovaginal and gonorrhoeae ( $p=0,02$ ). Factor that has significant relationship with coinfection between candidaisis vulvovaginal and gonorrhoeae is hormonal contraception ( $p=0,014$ ). Whereas other factors including age ( $p=0,367$ ), educational level ( $p=0,223$ ), and condom ( $p=0,193$ ) didn't have any significant relationship. FSW should get health education and promotion, especially about using contraception. </i>