

Hubungan antara infeksi necator americanus dan indeks massa tubuh pada anak-anak di Ende Nusa Tenggara Timur = The relationship between necator americanus infection and body mass index in children living in Ende East Nusa Tenggara

Vania Roswenda, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20385719&lokasi=lokal>

Abstrak

Infeksi Necator americanus adalah salah satu infeksi yang paling prevalen di daerah tropis seperti Indonesia. Kota Ende di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki prevalen 20 -49.9%. infeksi cacing tambang sering diasosiasikan dengan malnutrisi dan gangguan pertumbuhan pada anak serta anemia defisiensi besi dan hipoalbuminemia. Riset mengenai status nutrisi dan hubungannya dengan infeksi *N. americanus* masih minimal, terlebih di Indonesia. Sebuah studi oleh Sumanto et al. membahas tentang faktor resiko dari infeksi *N. americanus*. Tujuan dari studi ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang korelasi infeksi *N. americanus* dan status nutrisi. Infeksi ditentukan dengan real-time PCR dari sampel sebesar 185 anak-anak Ende, Nusa Tenggara Timur. Status nutrisi partisipan ditentukan oleh indeks massa tubuh (IMT). Data yang didapatkan dianalisa menggunakan SPSS 22 untuk mencari korelasi usia dan seks dengan infeksi serta infeksi dengan IMT. Uji statistik yang digunakan adalah regresi logistic dan chi-square. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa korelasi sex dan infeksi tidak signifikan, serta infeksi dan IMT juga tidak signifikan. Namun, hasil signifikan didapatkan pada korelasi usia (dibagi menjadi 2 kategori: dibawah dan diatas 10 tahun) dengan infeksi *N. americanus* dengan infeksi yang lebih prevalen di subjek yang berusia diatas 10 tahun. Karena riset ini merupakan cross-sectional, hubungan sebab-akibat langsung dari infeksi *N. americanus* dan IMT tidak dapat ditentukan dan harus dilakukan riset lebih lanjut.

.....

Necator americanus infection is one of the most prevalent hookworm infection affecting tropical regions such as Indonesia. East Nusa tenggara including Ende, has a prevalence of 20 to 49.9%. Hookworm infection is closely linked to malnutrition and impaired growth as well as iron deficiency anemia and hypoalbuminemia. The aim of this study is to explore the relationship between *N. americanus* infection and nutritional status. Infection was determined using real-time PCR from stool samples of 185 children in Ende, Nusa Tenggara Timur. Nutritional status was determined based on body mass index of participants. The data were analyzed using SPSS 22 to find the relationship between age or sex and *N. americanus* infection and between infection and BMI. Logistic regressions and chi-square tests were used. The result showed there were no significant relationship between sex and infection, and between infection and BMI. However, children aged above 10 years old had significantly higher prevalence of *N. americanus* infection compared to younger children. Due to being a cross-sectional research, the direct cause and affect relationship of *N. americanus* infection and BMI cannot be determined and further research should be done.