

Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI Eksklusif di Kelurahan Pakuan, Kota Bogor Tahun 2014 = Factors associated with practice of eksklusif breastfeeding in Pakuan Vilagge, Bogor City in year 2014

Alamanda Mutiara Permata Putri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20386239&lokasi=lokal>

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya proporsi pemberian ASI eksklusif dan faktor-faktor yang berhubungan di Kelurahan Pakuan Kota Bogor Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan responden adalah ibu yang mempunyai bayi berumur 7 bulan sampai dengan 12 bulan sejumlah 84 responden. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai Mei 2014. Hasil penelitian didapatkan presentase pemberian ASI eksklusif masih rendah yaitu hanya 27.4%. Faktor predisposisi yang mempunyai hubungan bermakna dengan pemberian ASI eksklusif adalah pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif ($p=0.000$, $OR=20.8$). Faktor pemungkin yang mempunyai hubungan bermakna adalah pekerjaan ibu ($p=0.004$, $OR=0.191$) dan akses terhadap tenaga kesehatan ($p=0,016$, $OR=3.324$). Faktor penguat yang mempunyai hubungan bermakna adalah dukungan keluarga ($p=0.000$, $OR=14.567$) dan dukungan tenaga kesehatan ($p=0.000$, $OR=23.850$). Saran untuk Dinas Kesehatan Kota Bogor adalah adanya pengawasan dari Dinas Kesehatan agar seluruh sarana kesehatan di Kota Bogor untuk menerapkan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Sedangkan untuk di Puskesmas Lawang Gintung adalah disarankan agar membuat klinik menyusui di puskesmas, dan memberikan penjelasan kepada ibu hamil dan menyusui, suami ibu hamil dan menyusui dan keluarga ibu hamil dan menyusui tentang pentingnya dan manfaat pemberian ASI eksklusif.

.....The objectives of this study was to asses the proportion of practice of exclusive breastfeeding and their associated factors in Pakuan Bogor City in year 2014. This study used a cross sectiona design study. Respondents are mothers who had babies aged 7 to 12 months a number of 84. The study found the percentage of practice exclusive breastfeeding was still low at only 27.4%. The predisposing factors significantly associated with exclusive practice breastfeeding is mother's knowledge ($p=0.000$, $OR=20.8$). The enabling factors significantly associated with exclusive breastfeeding adalah employment status ($p=0.004$, $OR=0.191$) and access to health workers ($p=0,016$, $OR=3.324$). The reinforcing factors significantly associated are family support ($p=0.000$, $OR=14.567$) and support of health workers ($p=0.000$, $OR=23.850$). Suggestions for Bogor City Health Office who developed policy of oversight to all health facilities in Bogor City to apply the 10 steps to successful breastfeeding. For Lawang Gintung Public Health Center, it is recommended make breastfeeding clinic, and deliver information to pregnant and lactating mothers, her husband and families on the importance and benefits of exclusive breastfeeding.