

Analisis perilaku pemanfaatan pelayanan gizi oleh ibu hamil dengan risiko KEK (kurang energi kronis) di klinik gizi Puskesmas Jombang Kota Cilegon tahun 2014 = Behavior analysis of nutritional service utilization by the pregnant women with risk ced chronic energy defeciency in nutrition clinical of health center Jombang Cilegon 2014 / Nia Kurniatillah

Nia Kurniatillah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20388651&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Status gizi ibu hamil berperan penting dalam kondisi kehamilan dan bayi yang akan dilahirkan. Masih tingginya kasus risiko KEK pada ibu hamil di Kota Cilegon terutama di wilayah kerja Puskesmas Jombang memerlukan upaya-upaya terobosan diantaranya melalui upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan gizi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan predisposing factor, enabling factor, need factor terhadap perilaku Pemanfaatan Pelayanan Gizi oleh ibu hamil dengan risiko KEK di Klinik Gizi Puskesmas Jombang.

Desain penelitian ini adalah non eksperimen dengan pengumpulan data secara cross sectional pada data primer yang terdiri dari 178 responden. Penelitian dilakukan pada bulan Maret-Juni 2014, menggunakan kuesioner yang diisi oleh responden. Analisis data dilakukan adalah analisis univariat, analisis bivariat menggunakan chi square, dan analisis multivariat menggunakan regresi logistik ganda model prediksi.

Hasil penelitian menunjukkan proporsi perilaku Pemanfaatan Pelayanan Gizi yang tidak baik lebih besar yaitu 62,4%. Faktor predisposing diantaranya paritas, pengetahuan, sikap, faktor enabling diantaranya dukungan suami, pendapatan keluarga, kepemilikan asuransi, dan faktor need berhubungan signifikan dengan Pemanfaatan Pelayanan Gizi. Variabel pengetahuan merupakan faktor dominan setelah dikontrol oleh pendapatan keluarga, kepemilikan asuransi, kebutuhan, paritas, sikap, dan dukungan suami.

<hr>

ABSTRACT

Nutritional status of pregnant women is important condition for pregnancy and the baby born. The high risk CED cases of among pregnant women in Cilegon, especially in Jombang health center area, required measured in improved nutritional health services.

This study aims to determine the influence of predisposing factors, enabling factors and need factors toward nutritional service utilization behavior by the pregnant women with risk CED in clinical nutrition Jombang health center.

This study was non experimental design using cross sectional methode approach

in data collection primary data was taken from 178 respondents who were total population. The study was conducted in March-June 2014, using questionnaires completed by respondents. Data were analyzed through univariate, bivariate using chi square, and multivariate analysis using multiple logistic regression with prediction model.

The Results showed that the poor utilization behavior is more than half of the respondents (62,4%). Predisposing factors such as parity, knowledge, attitudes, enabling factors such as support of her husband, family income, insurance ownership, and need factors are associated with nutritional service utilization. Knowledge is found as the most dominant variable measured of utilization in clinical nutrition after controlled by family income, insurance ownership, need, parity, attitudes, and support of her husband .