

Hubungan status menyusui ibu saat wawancara pada SDKI 2012 terhadap amenore postpartum 2 bulan pada ibu dengan bayi usia 2-6 bulan di Indonesia tahun 2012 analisis data SDKI 2012 = The relationship of maternal lactating status while interviewed in IDHS 2012 with postpartum amenorrhea at mother with 2-6 month babies age in Indonesia 2012 idhs 2012 data analysis / Hadi Nugroho

Hadi Nugroho, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20389466&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Amenore postpartum adalah periode akhir kehamilan perempuan sampai waktu ia mulai menstruasi kembali. Ini adalah periode ketidaksuburan sementara. Periode amenore postpartum merupakan peristiwa penting bagi reproduksi dalam rentang hidup perempuan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan status menyusui ibu dengan amenore postpartum. Menggunakan data sekunder SDKI 2012 dengan desain studi crossectional, dengan jumlah sampel sebesar 1171 responden. Pada analisis multivariat dengan regresi Cox pada status menyusui ibu yang berinteraksi dengan penggunaan kontrasepsi non hormonal terhadap amenore postpartum didapatkan nilai PR 2,18 (95% CI: 1,22-3,89). Ini menunjukkan pentingnya ibu untuk terus menyusui dan menggunakan kontrasepsi non hormonal setelah melahirkan sebagai salah satu upaya untuk menjaga jarak kelahiran yang baik pada periode postpartum.

<hr>

ABSTRACT

Postpartum amenorrhea is the end period of pregnancy women until she started the menstruating again. This is just temporary infertility period. Postpartum amenorrhea period is an important event of women's reproductive life span. The objective of this study was to determine the relationship of maternal lactating status with postpartum amenorrhea. Using IDHS 2012 secondary data's with crossectional design study, with 1171 respondents. In multivariate analysis with Cox regression maternal lactating status which is interacting with non-hormonal contraception use against postpartum amenorrhea showed the PR is 2,18 (95% CI: 1,22-3,89). It's showed how importance the mothers must continuing breastfeeding and using a non-hormonal contraception after delivering as a way to made a good spacing in the postpartum period.