

Hubungan karakteristik klien dan pelaksanaaun tugas kesehatan keluarga terhadap kualitas hidup klien tuberkulosis paru di Kabupaten pesawaran = The corelation of patients characteristics and implementation of family health tasks to health related quality of life among pulmonary tuberculosis patients in pesawaran / Siti Julaeha

Siti Julaeha, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20389916&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia dan di Kabupaten Pesawaran. Pelaksanaan tugas kesehatan keluarga dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien TB di Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik klien dan pelaksanaan tugas kesehatan keluarga dengan kualitas hidup klien TB paru. Desain deskriptif korelatif dengan pendekatan cross-sectional digunakan dalam penelitian pada 41 pasien TB berumur 18-59 tahun pada fase intensif pengobatan dari bulan April sampai Mei 2014. Hasil penelitian menunjukkan kualitas hidup klien TB terganggu. Ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan ($p = 0,034$), tugas kesehatan keluarga ($p = 0,005$), pendapatan ($p = 0,030$) dan dukungan keluarga ($p = 0,012$) dengan kualitas hidup klien TB. Pengembangan program yang terintegrasi antara program TB dan perawatan kesehatan masyarakat dan program lainnya untuk meningkatkan kemampuan keluarga melaksanakan tugas kesehatan keluarga.

<hr>

ABSTRACT

Tuberculosis (TB) is a major public health problem in Indonesia as well as in Pasawaran. The family health tasks implementation may affect Health Related Quality Of Life (HRQOL) among TB patients in Pesawaran. This study aims to determine the corelation of characteristics of patients and family health tasks to HRQOL TB patients. The descriptive correlative design with cross-sectional approach was applied to this study to 41 patients. The inclusion criteria for the respondents are aged range at 18-59 years old and under the initial phase of TB treatment from April to May 2014. The results showed that HRQOL among TB patients generally were impaired. The characteristics associated to HRQOL among TB patients were occupation ($p = 0.034$), family health tasks ($p = 0.002$), income ($p = 0.034$) and family support ($p = 0.012$). An integrated program need to be developed to increase family's ability to improve family health tasks.