

Dampak penggunaan asam laktat sebagai terapi adjuvan pada kasus keputihan = Effect of lactic acid as adjuvant treatment in relieving fluor albus discomfort within 24 hours / Gita Nurul Hidayah

Gita Nurul Hidayah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20390465&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menilai dampak asam laktat sebagai terapi adjuvan yang mengatasi gangguan kenyamanan dengan cepat. Merupakan studi eksperimental tersamar tunggal yang dilakukan di Poliklinik Obstetri Ginekologi RSCM dan beberapa klinik swasta Mei 2012 - Juni 2013. Subjek dengan skor gangguan kenyamanan awal 5 mendapatkan terapi antimikroba kombinasi dan dikelompokkan dalam empat kelompok. Pada kelompok A vagina dibersihkan dengan larutan asam laktat 1%, dan cebok vagina dengan larutan asam laktat 1%; kelompok B vagina dibersihkan dengan larutan asam laktat 1%, dan cebok vagina dengan air bersih; kelompok C vagina dibersihkan dengan NaCl 0,9%, dan cebok vagina dengan larutan asam laktat 1%; kelompok D vagina dibersihkan dengan NaCl 0,9%, dan cebok vagina dengan air bersih. Dihitung perubahan skor gangguan kenyamanan setelah 24 jam. Sejumlah 81 subjek dianalisa (25 subjek kelompok A, 26 kelompok B, 15 kelompok C, dan 15 kelompok D). Karakteristik subjek keempat kelompok tidak berbeda signifikan. Rerata skor gangguan kenyamanan awal keempat kelompok tidak berbeda signifikan ($p = 0.26$). Perbaikan skor gangguan kenyamanan pada kelompok uji A lebih baik dibandingkan C ($p = 0.009$), dan B lebih baik dibandingkan C ($p = 0,04$). Disimpulkan bahwa perbaikan skor gangguan kenyamanan signifikan pada kelompok dengan pembersihan vagina menggunakan asam laktat.

ABSTRAK
 This study evaluated the effect of lactic acid as adjuvant therapy. Single blinded experimental study using validated questionnaire done in obstetrics and gynecology clinic Cipto Mangunkusumo Hospital and several private clinic from May 2012 to June 2013. Subject having initial discomfort score 5 was being treated with combined antimicrobial treatment and being classified into four groups (group A: 1% lactic acid vaginal toilette and 1% lactic acid self vaginal wiping; group B: 1% lactic acid vaginal toilette and clean water self vaginal wiping; group C: NaCl 0.9% vaginal toilette and 1% lactic acid self vaginal wiping; group D: NaCl 0.9% vaginal toilette and clean water self vaginal wiping). We measure the change of discomfort score within 24 hours. We analyzed 81 subjects (25 in group A, 26 in group B, 15 in group C, and 15 in group D). The subject's character was not significantly different. The mean initial discomfort score was not significantly different ($p = 0.26$). We found that the reduction score of discomfort was significant in group A compared to group C ($p = 0.009$), and in group B compared to group C ($p = 0,04$). There is significant relieve of discomfort in those having vaginal toilette using lactic acid.