

## Dukungan nutrisi enteral pada pasien stroke dengan disfagia = Enteral nutritional support in stroke patients with dysphagia

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20391313&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

[ endahuluan: Disfagia salah satu gejala sisa stroke dapat memberikan komplikasi malnutrisi, dehidrasi dan pneumonia aspirasi. Oleh karena itu perlu dilakukan skrining disfagia untuk menentukan keamanan pemberian nutrisi secara per oral terutama saat weaning enteral nutrition (WEN). Dukungan nutrisi enteral diberikan sesuai kebutuhan pasien dan mempertimbangkan beberapa hal seperti kesadaran, kemampuan menelan dan waktu akses enteral yang diperlukan pasien.

Presentasi kasus: Empat kasus stroke yang membutuhkan dukungan nutrisi enteral selama perawatan di RSUPNCM. Kasus pertama seorang wanita berusia 55 tahun, obesitas morbid, mengalami stroke hemoragik. Tiga kasus berikutnya dengan stroke iskemik dari dua orang wanita berusia 84 dan 65 tahun, serta seorang laki-laki berusia 57 tahun. Keempat kasus memiliki lesi stroke yang berbeda-beda. Skrining disfagia dilakukan sebelum WEN.

Kesimpulan: Efek disfagia tergantung lokasi lesi stroke, skrining disfagia diperlukan sebelum WEN, tidak semua kasus dapat dilakukan skrining disfagia. Dukungan nutrisi enteral diberikan sesuai kebutuhan individual pasien dan hanya 1 kasus yang dapat mencapai WEN memerlukan evaluasi asupan nutrisi per oral, ABSTRACT Name Monika Anastasia KurniawanStudy Programme Clinical nutrition Program Pendidikan Dokter Spesialis 1Title Enteral Nutritional Support in Stroke Patients with DysphagiaMentor Dr dr Johana Titus MS SpGK Introduction dysphagia is one of stroke sequelae which cause malnutrition dehydration and aspiration pneumonia Thus dysphagia screening is needed to ensure the safety of oral nutritional support especially during weaning enteral nutrition WEN phase Enteral nutritional support is given according to patient's requirement and considering consciousness state ability to swallow and enteral access time needed Case presentation four stroke cases which need enteral nutritional support during hospitalization in RSUPNCM First case is 55 years old woman with morbid obesity and hemorrhagic stroke The other three cases are ischaemic stroke in women age 84 and 65 years old a man 57 years old These four cases have different stroke lesion Dysphagia screening was done before WEN Conclusion dysphagia influenced by stroke lesion location Dysphagia screening is needed before WEN Dysphagia screening cannot be done in all cases Enteral nutritional support is given according to the patient's requirement and WEN could only be done in 1 cases and this case need oral nutrition intake evaluation Keyword stroke dysphagia weaning enteral nutrition WEN enteral nutritional support]