

Pengaruh penambahan sukrosa dan Inokulum Acetobacter Aceti terhadap Cuka Air Kelapa = Influence of Sucrose and Acetobacter Aceti inoculums on Coconut Vinegar/ Mailani Dwi Hidayati

Mailani Dwi Hidayati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20402899&lokasi=lokal>

Abstrak

The objectives of this research were to obtain coconut vinegar with acetic acid concentrate more than 4% and to determine the

Penelitian bertujuan untuk menghasilkan asam cuka air kelapa dengan kadar asam lebih dari 4% dan mengetahui kandungan total polifenol dari asam cuka tersebut.

Cuka air kelapa dibuat melalui dua tahap fermentasi yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam asetat. Penambahan sukrosa sebanyak 15% (b/v) dan 20% (b/v) terhadap substrat diperlukan untuk mendukung fermentasi alkohol. Penambahan jumlah inokulum A. aceti fermentasi asam asetat dilakukan dengan tiga variasi 10% (v/v), 15% (v/v) dan 20% (v/v). Kadar asam asetat tertinggi yaitu $4,28 \pm 0,12$ % diperoleh pada hari ke-49 fermentasi asam asetat dengan penambahan sukrosa 15% (b/v) dan 10% (v/v) inokulum A. aceti. Hasil pengukur total polifenol berkisar antara $467,38 \pm 49,14$ dan $572,31 \pm 3,05$ mgGAE/100ml.

<hr>

ABSTRACT

concentration of total polyphenol in

the vinegar. Coconut vinegar was made through alcohol and acetic acid fermentation.

Sucrose addition 15% (b/v) and 20% (b/v) were needed to support alcohol

fermentation. Three concentrations of Acetobacter aceti inoculums were applied:

10% (v/v), 15% (v/v) and 20% (v/v). The highest acid concentration produced was

$4,28 \pm 0,12$ % in day 49 of the acetic acid fermentation, with 15% (b/v) sucrose and

10% (v/v) A. aceti inoculums addition. Total polyphenol's concentration were ranged

between $467,38 \pm 49,14$ and $572,31 \pm 3,05$ mgGAE/100ml.