

RCT : efek akupresur (SEA-BAND) terhadap penurunan insiden mual muntah pascaoperatif pada pasien yang dilakukan anestesia umum inhalasi = RCT : effect acupressure (SEA-BAND) for decreasing postoperative nausea vomiting incidence in patients undergo inhalation general anesthesia

Muhamad Arief Fadli, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20403481&lokasi=lokal>

Abstrak

Latar belakang PONV dapat terjadi pada 20-30% pasien, bahkan pada pasien- pasien yang berisiko tinggi bisa mencapai sekitar 70%. PONV menyebabkan peningkatan morbiditas, menurunnya kepuasan pasien dan meningkatnya biaya yang dikeluarkan pasien. Salah satu cara nonfarmakologi yang dapat dilakukan untuk menurunkan mual muntah pascaoperasi adalah dengan pemakaian akupresur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pemakaian akupresur Sea-Band® untuk menurunkan angka kejadian mual muntah pascaoperasi pada pasien yang menjalani anestesia umum inhalasi.

Metode Dilakukan pembiusan umum pada 88 pasien ASA 1-2 yang menjalani pembedahan risiko tinggi PONV. Tujuh pasien dikeluarkan, akupresur 41 sampel dan kontrol 40 sampel. Pada kelompok perlakukan diberikan dilakukan pemasangan akupresur Sea-Band® 30-60 menit sebelum dilakukan pembiusan. Seluruh sampel diberikan antiemetik. Dilakukan pencatatan angka kejadian mual muntah selama 0-2 jam pascaoperasi di ruang pulih dan 2-24 jam di ruang rawat inap. Tidak didapatkan terjadinya efek samping pada kedua kelompok.

Hasil: Didapatkan hasil yang tidak berbeda bermakna antara kedua kelompok dalam insidens mual dan muntah di ruang pemulihan (0-2 jam). Insidens mual dalam 0-2 jam antara akupresur vs placebo adalah 9,75 % vs 25 % ($p > 0,05$) dan insidens muntah dalam 0-2 jam antara akupresur vs placebo adalah 4,87 % vs 17,5 % ($p > 0,05$). Insidens mual dalam 2-24 jam antara akupresur vs placebo adalah 2,43 % vs 20 % ($p < 0,05$). Insidens muntah dalam 2-24 jam antara akupresur vs placebo adalah 0 % vs 7,5 % ($p > 0,05$). Tidak didapatkan terjadinya efek samping pada kedua kelompok. Tercatat bahwa 90,2% mengatakan puas dengan manfaat penggunaan akupresur dan pemberian ondansetron, bahkan pada kelompok yang sama sebanyak 4,9% menyatakan sangat puas

Kesimpulan Penggunaan akupresur Sea-Band® dengan Ondansetron terbukti dapat menurunkan angka kejadian mual pada rentang waktu 2-24 jam setelah operasi dengan anestesia umum inhalasi.

<hr>

Background : PONV may occur in 20-30 % of patients , even in patients at high risk could reach about 70 %. PONV lead to increased morbidity , decreased patient satisfaction and increased patient costs . One way nonpharmacological do to reduce postoperative nausea and vomiting is to use acupressure . This study aims to determine the effectiveness of the use of Sea - Band® acupressure to reduce the incidence of postoperative nausea and vomiting in patients undergoing general anesthesia inhalation .

Methods : Do general anesthesia in 88 ASA 1-2 patients undergoing high- risk surgery PONV . Seven patients were excluded , acupressure 41 samples and 40 control samples . In the treatment group was given did the installation of Sea - Band® acupressure 30-60 minutes prior to anesthesia . The entire sample is given antiemetic . Do recording the incidence of nausea and vomiting for 0-2 hours postoperatively in the

recovery room and 2-24 hours in the inpatient unit . There were no side effects in both groups .

Results : Obtained results were not significantly different between the two groups in the incidence of nausea and vomiting in the recovery room (0-2 hours) . The incidence of nausea within 0-2 hours between acupressure vs placebo was 9.75 % vs. 25 % ($p > 0.05$) and the incidence of vomiting within 0-2 hours between acupressure vs placebo was 4.87 % vs. 17.5 % ($p > 0.05$) . The incidence of nausea in 2-24 hours between acupressure vs placebo was 2.43% vs. 20 % ($p < 0.05$) . The incidence of vomiting in 2-24 hours between acupressure vs placebo was 0 % vs. 7.5 % ($p > 0.05$) . There were no side effects in both groups . It was noted that 90.2 % said satisfied with the benefits of using acupressure and ondansetron administration , even in the same group as much as 4.9 % said very satisfied

Conclusions : The use of acupressure by Sea - Band® Ondansetron shown to reduce the incidence of nausea in the period 2-24 hours after surgery with general anesthesia inhalation.