

Hubungan ekspresi p53 dan Ki67 dengan parameter histopatologik prediktif metastasis pada karsinoma sel skuamosa penis = The association of expression of p53 and Ki67 to metastasis predictive histopathologic parameter in squamous cell carcinoma of penis / Romi Beginta

Romi Beginta, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20403601&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Latar belakang: Penentuan faktor risiko metastasis kelenjar getah bening dan prognosis pasien Karsinoma Sel Skuamosa (KSS) penis tidak sebanyak KSS pada organ lain. Penggunaan parameter patologi, ekspresi p53 dan Ki67 dapat digunakan sebagai variabel penentu prognosis maupun terapi KSS penis namun masih diperlukan data yang lebih banyak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara ekspresi p53 dan Ki67 terhadap parameter histopatologik yang mempengaruhi risiko metastasis.

Bahan dan Cara: Penelitian ini merupakan studi potong lintang dengan melakukan pulasan imunohistokimia p53 (Novocastra DO-7) dan Ki67 (Biocare CRM 325) pada 25 sampel KSS penis.

Hasil: Ekspresi p53 positif ditemukan pada 48% KSS penis dan ekspresi Ki67 tinggi ditemukan pada 52% kasus. Tidak menemukan hubungan yang bermakna antara ekspresi p53 dan parameter-parameter histopatologik. Didapatkan hubungan bermakna antara ekspresi Ki67 terhadap derajat diferensiasi tumor dan adanya invasi uretra.

Kesimpulan: Ekspresi p53 tidak dapat digunakan sebagai faktor prediktif risiko metastasis KSS penis.

Ekspresi Ki67 secara sebagian berhubungan dengan faktor risiko metastasis KSS penis.

<hr>

ABSTRACT

Background: Determination of lymph node metastasis risk factors and prognosis of patients with Squamous Cell Carcinoma(SCC) of the penis is not as much as SCC in other organs. Pathological parameters, expression of p53 and Ki67 could be used as a determinants of prognosis and therapy in SCC of the penis but more data is still needed. This study aims to clarify the relationship between the expression of p53 and Ki67 to histopathological parameters that affect the risk of metastasis.

Method: This study was a cross-sectional study by using immunohistochemical staining of p53 (Novocastra DO-7) and Ki67 (Biocare CRM 325) in 25 samples of SCC of the penis

Result: Expression of p53 positive was found in 48% of SCC of the penis and higher expression of Ki67 was found in 52% of cases. No significant association between p53 expression and histopathologic parameters. Obtained significant correlation between the expression of Ki67 on the degree of tumor differentiation and invasion urethra.

Conclusion: P53 expression can not be used as a predictive factor of risk metastatic in SCC of the penis.

Ki67 expression is partially associated with risk factors for metastatic SCC of the penis.