

Analisis praktik klinik keperawatan kesehatan masyarakat perkotaan pada pasien gagal ginjal kronis dengan hemodialisis di Ruang Rawat Penyakit Dalam lantai 5 Selatan RSUP Fatmawati Jakarta = Analysis of clinical practice urban public health nursing in chronic kidney disease patient with hemodialysis at Internal Medicine Ward south 5th floor Fatmawati hospital

Pebriana Damaris, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20416626&lokasi=lokal>

Abstrak

Insiden penyakit gagal ginjal kronis GJK banyak terjadi di kalangan masyarakat perkotaan akibat gaya hidup tidak sehat. Kelebihan volume cairan adalah salah satu masalah utama pada pasien GJK sehingga membutuhkan hemodialisis sebagai penanganan. Meskipun pasien telah menjalani hemodialisis masalah kelebihan volume cairan masih saja terjadi sehingga pasien membutuhkan pembatasan asupan cairan. Karya Ilmiah Akhir Ners ini menggunakan metode analisis kasus yang bertujuan untuk menganalisis pembatasan asupan cairan perhitungan insensible water losses minimal pada pasien hemodialisis yang dirawat di rumah sakit.

Hasil intervensi menunjukkan bahwa pembatasan asupan cairan terbukti efektif mengatasi kelebihan volume cairan pada pasien hemodialisis. Pelaksanaan pembatasan asupan cairan memerlukan pemantauan yang akurat oleh perawat untuk mengatasi kelebihan volume cairan pada pasien hemodialisis.

.....The incidence of chronic kidney disease CKD tends to increase in urban communities caused by unhealthy lifestyles. The excess fluid volume becomes main problem in CKD patients thus requiring hemodialysis as treatment. Although patients have been undergone hemodialysis still occurred excess fluid volume then restriction fluid intake must be done.

This clinical nursing report with case analysis method aimed to analyze fluid restriction intervention calculating minimum insensible water losses on hemodialysis patients.

The result showed this intervention became effective to overcome excess fluid volume. The intervention of fluid restriction requires accurate fluid monitoring by nurses to overcome excess fluid volume on hemodialysis patients.