

Analisis praktik klinik keperawatan kesehatan masyarakat perkotaan dengan asuhan keperawatan remaja pada periode perinatal = Analysis of urban health community clinical maternity nursing in adolescent during perinatal period

Dharmastuti Ajeng Hapsari Kusuma Putri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20416674&lokasi=lokal>

Abstrak

Gaya hidup perkotaan akses informasi yang bebas serta perilaku berisiko remaja merupakan masalah yang terjadi pada remaja dan menyebabkan terjadinya kehamilan pada remaja. Kehamilan remaja dapat menimbulkan masalah kesehatan baik bagi ibu maupun bayi. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada Ny SO selama periode perinatal. Masalah keperawatan yang ditemukan pada Ny SO meliputi ansietas ketidakefektifan perfusi jaringan perifer risiko ketidakmampuan menjadi orang tua nyeri diskontinuitas pemberian ASI and risiko infeksi.

Diskontinuitas pemberian ASI merupakan masalah yang dapat muncul pada remaja. Hal ini disebabkan pengetahuan remaja yang masih minim mengenai ASI. Dukungan sosial dan edukasi kesehatan mengenai ASI dapat meningkatkan pengetahuan mengenai ASI dan keinginan untuk menyusui. Setelah dilakukan intervensi evaluasi yang didapatkan bahwa klien mau melanjutkan pemberian ASI dan pengetahuan mengenai ASI meningkat.

.....Urban lifestyle free access of information and also adolescent risk behavior are problems that happen in adolescent and it cause teenage pregnancy. Teenage pregnancy can cause health problem for the mother and the baby. The aim of this report is to describe nursing care to Mrs SO during perinatal period. Nursing problems were found in Mrs SO are anxiety ineffective tissue perfussion risk for impaired parenting pain interrupted breastfeeding and risk of infection.

Interrupted breastfeeding was a major problem in pregnant mother. It's because the deficit of knowledge about breastfeeding Social support and health education about breastfeeding can increase the knowledge and desired to breastfeed After delivering nursing intervention the evaluation of intervention was client desire to continue breastfeeding and the knowledge about breastfeeding increased.