

# Hubungan antara gejala positif pada gangguan psikotik dengan perilaku kekerasan pada warga binaan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa II Cipayung Jakarta Timur = Correlation between positive symptoms of psychotic disorder with violent behavior in residents of Bina Laras Harapan Sentosa II Mental Rehabilitation Cipayung East Jakarta / Siti Dwinanti Amanda

Siti Dwinanti Amanda, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20423375&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Latar Belakang: Perilaku kekerasan yang berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain banyak dijumpai pada orang dengan gangguan psikotik. Salah satu penyebab terjadinya perilaku kekerasan adalah gejala positif yang dialami mereka. Dengan mengetahui hubungan antara gejala positif dan perilaku kekerasan, diharapkan dapat mencegah terjadinya perilaku kekerasan dan dapat dilakukan penatalaksanaan yang sesuai. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara gejala positif dengan perilaku kekerasan pada gangguan psikotik.

Metode: Penelitian ini adalah penelitian analitik potong lintang. Pengambilan sampel dilakukan dengan simple random sampling pada warga binaan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 Cipayung, sebanyak 90 orang, yang dirawat selama periode April-Mei 2014. Pada subyek penelitian dilakukan wawancara penapisan gejala psikotik menggunakan MINI ICD 10 yang dilanjutkan dengan pemeriksaan gejala positif menggunakan PANSS skala positif dan penilaian perilaku kekerasan menggunakan OAS.

Hasil: Pada hasil analisis, terdapat hubungan antara gejala positif dengan perilaku kekerasan ( $p < 0,001$ ;  $r = 0,629$ ). Gejala positif yang memiliki hubungan sedang dengan perilaku kekerasan antara lain gaduh gelisah dan kejaran. Sedangkan waham, permusuhan dan perilaku halusinasi memiliki hubungan lemah dengan perilaku kekerasan. Gejala positif berupa kekacauan proses pikir dan waham kebesaran memiliki hubungan sangat lemah dengan perilaku kekerasan.

Kesimpulan: Terdapat hubungan yang bermakna antara gejala positif dengan perilaku kekerasan pada gangguan psikotik.

*Background:* Violent behaviors which potentially harmful to self and others are found usually in people with psychotic disorder. One of the reasons for the behavior to take place is the positive symptoms experienced by these individuals. By determining the association between positive symptoms and violent behaviors, it is hoped that these behaviors can be prevented and managed appropriately. This research is conducted to find association between positive symptoms and violent behaviors in psychotic behavior disorder.

*Method:* This is an analytical cross sectional research. Samples were taken by means of simple random sampling from residents of Bina Laras Harapan Sentosa 2 Cipayung Social Rehabilitation center, with 90 subjects cared for during the period of April to May 2014. Subjects were given screening interview for

psychotic symptoms using MINI ICD 10, then proceed to positive symptoms examination using positive scale of PANSS and rating of violent behavior using OAS.

Result: The coefficient correlation between positive symptoms and violent behaviors was  $r = 0,629$  ( $p < 0,001$ ). Positive symptoms with moderate correlation with violent behaviors are agitation and paranoia. Meanwhile delusion, hostility and hallucinatory behaviors have weak correlation with violent behaviors. Positive symptoms such as disorganized thought process and grandiose delusion have very weak correlation with violent behaviors.

Conclusion: Significant correlation is found between positive symptoms and violent behaviors in psychotic disorder.