

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pasien miastenia gravis = Factors influencing the quality of life of myasthenia gravis patient / Tri Antika Rizki Kusuma Putri

Tri Antika Rizki Kusuma Putri, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20433084&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Miastenia gravis merupakan kelainan autoimun yang menyerang neurotransmitter di tautan neuromuskular dan menghambat terjadinya kontraksi di otot. Kelemahan otot yang terjadi menyebabkan keterbatasan aktivitas fisik serta terganggunya kesejahteraan psikologis dan interaksi sosial yang dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien miastenia gravis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pada pasien miastenia gravis. Penelitian ini merupakan deskriptif analitik dengan desain cross sectional yang melibatkan 76 pasien. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara lama menderita ($p = 0.014$), fungsi fisik ($p = 0.000$), dukungan sosial ($p = 0.003$), penghasilan ($p = 0.045$), klasifikasi ($p = 0.000$), status emosional ($p < 0.05$), dan efek samping obat ($p = 0.005$) terhadap kualitas hidup pasien miastenia gravis. Faktor yang paling mempengaruhi kualitas hidup adalah ketergantungan konsumsi obat (koef. B = 16.804). Hasil pada penelitian ini akan membantu dalam merencanakan intervensi holistik pada pasien miastenia gravis.

<hr>

ABSTRACT

Myasthenia gravis is an autoimmune disorder that affect neurotransmitter at neuromuscular junction wich inhibits muscles contractions. Muscle weakness occurs causing limitation of physical activity as well as the disruption of psychological well-being and social interaction that can affect the quality of life of patients with myasthenia gravis. This study aims to determine the factors that affect the quality of life in myasthenia gravis patients. This research is a descriptive analytic with cross sectional design involving 76 patients. The results in this research showed a significant relationship between period of suffering ($p = 0.014$), physical function ($p = 0.000$), social support ($p = 0.003$), earnings ($p = 0.045$), classification ($p = 0.000$), emotional states ($p < 0.05$), and the side effects of medication ($p = 0.005$) with quality of life of patients with myasthenia gravis. The factors that most affect the quality of life is the dependence of drug consumption (koef. B = 16,804). The results of this research will assist for an holistic nursing interventions for myasthenia gravis patients.