

Refluks laringofaring sebagai faktor risiko otitis media supuratif kronik: kajian berdasarkan hubungan reflux symptom index dan reflux finding score dengan kadar pepsin sekret telinga tengah = Laryngopharyngeal reflux as a risk factor of chronic suppurative otitis media study based on reflux symptom index and reflux finding score relation to pepsin level in the middle ear

Ayu Astria Sriyana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20435168&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### <b>ABSTRAK</b><br>

Latar belakang: Otitis media supuratif kronik merupakan penyakit yang memiliki banyak faktor risiko, salah satunya yang diduga adalah peran dari refluks laringofaring. Refluks laringofaring (RLF) merupakan naiknya cairan lambung yang mengenai daerah laring dan faring. Penelitian mengenai refluks pada pasien OMSK dewasa belum banyak diteliti sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peranan RLF dalam patofisiologi OMSK. Tujuan: Meningkatkan pengetahuan mengenai peran RLF sebagai salah satu faktor risiko OMSK. Metode: Penelitian potong lintang analitik untuk mengetahui refluks laringofaring sebagai faktor risiko OMSK berdasarkan hubungan reflux symptom index (RSI), reflux finding score (RFS) terhadap kadar pepsin. Hasil: Proporsi subjek OMSK dengan pepsin positif pada sekret telinga tengah sebesar 59,5%. Rerata kadar pepsin sekret telinga tengah lebih tinggi secara bermakna pada kelompok OMSK dengan RFS positif dibandingkan kelompok RFS negatif ( $P<0,05$ ). RFS positif mempunyai risiko 5,13x terdapat pepsin positif pada telinga tengah ( $CI\ 95\% = 1,095-24,073$ ). Tidak didapatkan hubungan bermakna antara nilai RSI dengan kadar pepsin telinga tengah. Kesimpulan: Penilaian RFS perlu dilakukan pada pasien OMSK untuk mengetahui adanya RLF yang dapat meningkatkan risiko terdapatnya pepsin di telinga tengah dan kemungkinan berperan dalam inflamasi kronis OMSK. RLF perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui hubungannya sebagai faktor risiko OMSK.

Kata kunci: Refluks laringofaring, pepsin, OMSK

<hr>

### <b>ABSTRACT</b><br>

Background: Laryngopharyngeal reflux is suspected to be the one of risk factor that contributes in chronic suppurative otitis media. Laryngopharyngeal reflux is defined as the reflux of gastric content into larynx and pharynx. This study purpose is to know the role of laryngopharyngeal reflux in the pathophysiology of CSOM. Objective: To increase the knowledge about the role of LPR as a risk factor CSOM. Methods: This study is a cross-sectional analytic research to study LPR as a risk factor CSOM based on RSI and RFS relationship with pepsin level in the middle ear. Results: This study found 59.5% CSOM subjects having positive pepsin in the middle ear. Mean middle ear pepsin levels were significantly higher in the group of CSOM with positive RFS than negative group ( $p<0.05$ ). RFS positive increase the risk by 5.13 times the presence of positive pepsin in the middle ear ( $95\% CI = 1.095$  to  $24.073$ ). There are no significant relationship between RSI with pepsin levels in the middle ear. Conclusion: Positive RFS increase the risk of the presence of pepsin in the middle ear and may have role in chronic inflammation. LPR should be investigated further to determine its relationship as a CSOM risk factor

Keywords: Laryngopharyngeal reflux, Pepsin, CSOM