

## Kualitas air pada uji pembesaran Larva ikan Sidat (*Anguilla spp.*) dengan sistem Pemeliharaan yang berbeda

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20439184&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Ikan sidat (*Anguilla spp.*) merupakan ikan bernilai ekonomis penting. Beberapa Negara seperti Jepang, Korea dan Negara-negara di Eropa merupakan pangsa pasar ikan sidat yang potensial. Penyebaran ikan ini di Indonesia sangat luas, salah satunya perairan Danau Poso Sulawesi Tengah. Stok ikan sidat memiliki keterbatasan karena belum dapat dikembangkan dengan sistem budidaya, sehingga ketersediaannya sangat tergantung dari alam. Sampai saat ini aktivitas perikanan terhadap ikan sidat adalah kegiatan pembesaran sampai ukuran bernilai ekonomis. Penelitian dilakukan dari Mei-September 2012 di Pusat Penelitian Limnologi LIPI. Tujuan penelitian untuk mengetahui kondisi kualitas air pada sistem pemeliharaan yang sesuai untuk pembesaran larva ikan sidat. Pembesaran larva sidat menggunakan dua sistem pemeliharaan, yaitu sistem bak air diam (kubus) dan bak air mengalir (raceway) dengan tiga ulangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter konduktivitas ( $p=0,047$ ), Nitrit ( $p=0,004$ ), Suhu ( $p=0,046$ ), Pospat ( $p=0,049$ ) serta Total Pospat ( $p=0,032$ ) menunjukkan perbedaan nyata pada dua sistem pemeliharaan tersebut. Hasil analisis PCA menunjukkan pertumbuhan berat ( $W$ ) dan panjang ( $L$ ) larva sidat dipengaruhi oleh konsentrasi DO, Suhu, TP, PO<sub>4</sub> dan NH<sub>4</sub>. Rata-rata pertumbuhan panjang larva sidat pada bak air diam 65,59 % (3,19 cm) sedangkan pada bak air mengalir 65,92 % (3,25 cm). Rata-rata pertumbuhan berat larva sidat pada bak air diam 384,49 % (0,756 gr), sedangkan pada bak air mengalir 412,72 % (0,796 gr). Hasil ini menunjukkan bahwa bak uji air mengalir lebih baik untuk pemeliharaan atau pembesaran larva ikan sidat.