

Gambaran Epidemiologi Wanita Menikah yang Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) dan Melakukan Upaya Aborsi di Indonesia dalam Kurun Waktu 5 Tahun (2005-2010) (Analisis Data Sekunder Riskesdas Tahun 2010) / Puji Sulistyarini

Puji Sulistyarini, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20440782&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Aborsi di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan. Di tahun 2002 di Indonesia telah terestimasi adanya 2.000.000 insiden aborsi yang tidak aman. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran epidemiologi wanita menikah yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan melakukan upaya aborsi di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun (2005-2010). Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif case series dengan melihat data sekunder Riskesdas 2010. Penelitian dilakukan pada wanita menikah yang mengalami KTD dan melakukan upaya aborsi untuk mengakhiri kehamilannya yang berjumlah 29 orang. Dari penelitian diketahui bahwa wanita yang melakukan upaya aborsi berusia di atas 30 tahun (79,3%), tingkat pendidikan menengah (48,3%), bekerja (55%), memiliki lebih dari 2 anak (51,7%), status ekonomi tertinggi (37,9%) menggunakan metode kontrasepsi (69%), dan tinggal perkotaan (69%). Metode yang banyak digunakan adalah minum jamu dan aborsi dilakukan sendiri (41,4%). Paling banyak alasan responden melakukan upaya aborsi adalah jarak kelahiran yang terlalu dekat (20,7%). Dari penelitian ini diharapkan pemberian informasi kesehatan mengenai aborsi lebih ditekankan mengenai aborsi yang tidak aman.

<hr>

Abortion is still health problem in Indonesia. In 2002, Indonesia has estimated there are 2.000.000 incidents of unsafe abortion. The aim of this research is to describe epidemiology of married woman who have an unwanted pregnancy and perform abortion in Indonesia within 5 years period (2005-2010). This study used a descriptive case series design by looking at secondary data of Riskesdas 2010. This study was conducted in married woman who have an unwanted pregnancy and perform abortion to terminate that pregnancy, with number of sample is 29 respondents. This study found that woman who perform abortion are over 30 year old (79,3%), secondary education level (48,3%), work (55%), having more than 2 children (51.7%), on highest economic status (37.9%), use contraceptive methods (69%), and urban residence (69%). The most method used to terminate pregnancy is drink traditional medicine and performed abortion alone/ by herself (41.4%). Most reason for terminate the pregnancy because is too close from previous pregnancy (20,7%). From this study, the health provider should give more information about abortion especially unsafe abortion to woman.