

Aktivitas antibakteri ekstrak daun kayu ulin (*eusideroxylon zwageri*) terhadap methicillin-resistant staphylococcus aureus (MRSA) =  
Antibacterial activity of ironwood (*eusideroxylon zwageri*) leaf extract on methicillin resistant staphylococcus aureus (MRSA)

Erina Nindya Lestari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20444064&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Infeksi bakteri Methicillin-resistant Staphylococcus aureus MRSA merupakan salah satu masalah kesehatan dengan prevalensi yang tinggi di Asia, khususnya Indonesia dengan kepadatan penduduk yang juga tinggi sehingga berpengaruh terhadap penyebaran penyakit infeksi ini. Hingga saat ini, vankomisin merupakan antibiotik yang dapat digunakan untuk menangani infeksi MRSA. Untuk itu, perlu dikembangkan alternatif antibiotik agar dapat mencegah peningkatan penyakit infeksi akibat MRSA. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak daun kayu ulin *Eusideroxylon zwageri* terhadap MRSA dengan melihat konsentrasi hambat minimum KHM dan konsentrasi bunuh minimum KBM.

Penelitian menggunakan metode makrodilusi ekstrak daun kayu ulin *Eusideroxylon zwageri* dan antibiotik vankomisin sebagai pembanding. Konsentrasi bakteri MRSA dalam penelitian ini sesuai dengan Mc Farland 0,5. Hasil penelitian menunjukkan terjadi kekeruhan pada tabung di setiap konsentrasi dan tumbuh koloni bakteri pada agar Mueller Hinton yang menunjukkan adanya bakteri MRSA. Oleh karena itu, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun kayu ulin *Eusideroxylon zwageri* pada konsentrasi 1280 g/mL hingga 0,625 g/mL tidak memiliki aktivitas antibakteri terhadap MRSA.

.....Bacterial infection of Methicillin resistant Staphylococcus aureus MRSA is one of the health problem with high prevalence in Asia, especially Indonesia with high population density that influence the spread of this infectious disease. Until now, vancomycin is an antibiotic that can be used to treat MRSA infection. It is necessary to develop alternative antibiotic in order to prevent the increase of infection due to MRSA. This study was conducted to determine the antibacterial activity of ironwood *Eusideroxylon zwageri* leaf extract against MRSA to see the minimum inhibitory concentration MIC and the minimum bactericidal concentration MBC.

This research used macrodilution method with ironwood *Eusideroxylon zwageri* leaf extract and vancomycin as a comparison. Concentration of MRSA in this study based on Mc Farland 0,5. The results showed turbidity occurred in tubes at each concentrations and bacterial colonies grown on Mueller Hinton Agar that indicate the presence of MRSA. Therefore, from this study we can conclude that the ironwood *Eusideroxylon zwageri* leaf extract at concentration of 1280 g mL until 0,625 g mL do not have antibacterial activity against MRSA.