

The association between cow's milk allergy and malnutrition in children under 3 years old with diarrhea treated in Cipto Mangunkusumo Hospital from the year 2012 to 2016 = Asosiasi antara alergi susu sapi dan malnutrisi pada anak usia kurang dari 3 tahun dengan diare di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo pada tahun 2012 sampai 2016

Diar Riyanti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20444139&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### **<b>ABSTRAK</b><br>**

Diarrhea is one of the most common gastro intestinal problem in Indonesia. One of the causes of diarrhea in children might be adverse reactions to food. Cow 's milk allergy is the most prevalent food allergy as a result of an abnormal immunologic reaction to cow 's milk protein. The gastrointestinal symptoms, including diarrhea occur in 50-60 children with cow 's milk allergy. The aim of this research is to identify the prevalence of cow 's milk allergy in pediatric patients who suffer from diarrhea and its association to nutritional status and age of patients who were treated in RSUPN Cipto Mangunkusumo from the year 2012 to 2016. The research design used for this study is a case control study using a secondary data. The data was obtained from stool analysis profile and medical record from pediatric patients in Gastrohepatology Division, Department of Pediatric Health, Cipto Mangunkusumo Hospital. There were 13 patients suffer from cow 's milk allergy and 78 patients without allergy compared in this study. The prevalence of cow 's milk allergy and malnutrition in pediatric patients with diarrhea were 14.3 and 38.4 . There is no association between cow 's milk allergy and weight for age, height length for age, and weight for length height p > 0.05 . In conclusion, cow 's milk allergy is not associated with malnutrition in pediatric patients under three years old who suffered from diarrhea.

<hr>

### **<b>ABSTRACT</b><br>**

Diare adalah salah satu masalah gastro usus yang paling umum di Indonesia. Salah satu penyebab diare pada anak-anak mungkin reaksi negatif terhadap makanan. Alergi susu sapi adalah alergi makanan yang paling umum sebagai akibat dari reaksi imunologi abnormal terhadap protein susu sapi . Gejala gastrointestinal, termasuk diare terjadi pada 50-60 anak-anak dengan alergi susu sapi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi prevalensi alergi susu sapi pada pasien anak yang menderita diare dan hubungannya dengan status gizi dan usia pasien yang dirawat di RSUPN Cipto Mangunkusumo dari tahun 2012 hingga 2016. Desain penelitian digunakan untuk penelitian ini adalah studi kasus kontrol menggunakan data sekunder. Data diperoleh dari profil analisis tinja dan rekam medis dari pasien anak di Divisi Gastrohepatologi, Departemen Kesehatan Anak, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ada 13 pasien menderita alergi susu sapi dan 78 pasien tanpa alergi dibandingkan dalam penelitian ini. Prevalensi alergi susu sapi dan gizi buruk pada pasien anak dengan diare adalah 14,3 dan 38,4. Tidak ada hubungan antara alergi susu sapi dengan berat badan untuk usia, tinggi badan untuk usia, dan berat badan untuk tinggi badan p > 0,05. Kesimpulannya, alergi susu sapi tidak dikaitkan dengan kekurangan gizi pada pasien anak di bawah tiga tahun yang menderita diare.