

Perbedaan proporsi tingkat depresi lansia yang tinggal di rumah dan di Panti Wreda Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat tahun 2016 = The proportion differences of depression levels between elderly living in their own home and living in Nursing Home at Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 2016

Deviana Nuraini, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20444232&lokasi=lokal>

Abstrak

Peningkatan angka harapan hidup menyumbang pada peningkatan populasi lansia di Indonesia. Masalah kesehatan yang sering terjadi pada lansia adalah depresi. Depresi semakin meningkat pada lansia yang tinggal di panti wreda. Namun, penelitian untuk membandingkan tingkat depresi pada lansia di panti wreda dan di rumah masih jarang ditemukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan proporsi tingkat depresi pada lansia yang tinggal di rumah dan di panti wreda serta faktor-faktor sosiodemografi yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan analitik cross sectional comparison dengan metode pengambilan sampel cluster random sampling dari populasi terjangkau di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Data tingkat depresi diperoleh dari kuesioner Geriatric Depression Scale GDS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 92 responden yang tinggal di rumah, didapatkan 69,9 diantaranya tidak depresi, 12 nya kemungkinan depresi, dan 18,5 nya mengalami depresi. Sementara itu, dari 43 responden yang tinggal di panti wreda, didapatkan 14 diantaranya tidak depresi, 34,9 nya kemungkinan depresi, dan 51,2 nya mengalami depresi. Nilai p hasil uji Chi Square didapatkan.

.....The increase in life expectancy increases the elderly population in Indonesia. Health problems which often occurs among elderly is depression. The rate of depression increases in the elderly living in institutions, like nursing home. But, there is few research done to compare the depression levels between elderly living in their own house and living in nursing home. This research is aimed to identify the difference of depression levels between elderly living in their own house and living in nursing home and also some sociodemographic factors affect it. This research is cross sectional comparison study which sampels are elderly in Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat using cluster random sampling. Gerictric Depression Scale GDS is used to collect the data of depression levels among elderly. The results from 92 respondents living in their own house showed that 69,9 do not have depression, 12 probably have depression, and 18,5 have depression. While, the results from 43 respndents living in nursing home showed that 14 do not have depression, 34,9 probably have depression, and 51,2 have depression. The statistical tests Chi Square showed.