

Faktor faktor yang mempengaruhi fatigue pada pasien yang menjalani hemodialisis / Rumentalia Sulistini, Krisna Yetti, Rr. Tutik Sri Hariyati

Rumentalia Sulistini, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20449060&lokasi=lokal>

Abstrak

Chronic Kidney Disease merupakan kumpulan sindrom klinik dengan penurunan fungsi ginjal progresif.

Prevalensi fatigue

tinggi pada pasien hemodialisis. Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor yang berhubungan dengan

Fatigue pada pasien

yang menjalani hemodialisis. Desain penelitian analitik observasional. Teknik non probability sampling.

Hasil penelitian tidak

ada hubungan tingkat fatigue dengan pekerjaan ($p= 0,732$; $\alpha= 0,05$), status dukungan ($p= 0,679$;

$\alpha= 0,05$), jenis kelamin ($p=$

$0,914$; $\alpha= 0,05$), frekuensi ($p= 0,676$; $\alpha= 0,05$), jarak fasilitas ($p= 0,149$; $\alpha= 0,05$),

komplikasi ($p= 0,062$; $\alpha= 0,05$), merokok

($p= 0,062$; $\alpha= 0,05$), alkohol ($p= 0,075$; $\alpha= 0,05$), riwayat penyakit ($p= 0,42$; $\alpha= 0,05$),

dan status nutrisi ($p= 0,168$; $\alpha= 0,05$).

Ada hubungan tingkat fatigue dengan latihan fisik ($p= 0,027$; $\alpha= 0,05$), lama menjalani hemodialisis

($p= 0,019$; $\alpha= 0,05$), kadar

hemoglobin ($p= 0,029$; $\alpha= 0,05$), penghasilan ($p= 0,07$; $\alpha= 0,05$), dan pendidikan ($p= 0,040$;

$\alpha= 0,05$). Faktor dominan adalah

penghasilan. Perawat hemodialisis diharapkan memonitoring fatigue, memberikan pendidikan kesehatan tentang latihan fisik

dan memberikan asuhan keperawatan holistik.