

Beban keluarga merawat lansia dapat memicu tindakan kekerasan dan penelantaran terhadap lansia / R. Siti Maryam, Rosidawati Rosidawati, Ni Made Riasmini, Eros Siti Suryati

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20449113&lokasi=lokal>

Abstrak

Memberikan perawatan pada lansia dengan penyakit kronis menimbulkan perasaan strain atau beban (beban) pada caregiver (pengasuh) yang dapat mempengaruhi kualitas hidup keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan beban keluarga merawat lansia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional menggunakan uji regresi logistik ganda. Sampel berjumlah 205 responden dengan pengambilan sampel secara gugus bertahap. Hasil penelitian menunjukkan hubungan bermakna antara usia keluarga ($p=0,052$; $\alpha=0,05$), status kesehatan ($p=0,018$; $\alpha=0,05$), pengetahuan ($p=0,046$; $\alpha=0,05$), dan kepuasan ($p=0,033$; $\alpha=0,05$) dengan beban merawat lansia. Faktor yang paling berkontribusi terhadap beban merawat adalah status kesehatan keluarga ($OR=2,632$). Rekomendasi hasil penelitian yaitu gambaran tentang tingkat beban yang dialami keluarga dalam merawat lansia dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengembangkan program pemberdayaan keluarga serta program promosi kesehatan untuk mengurangi beban merawat yang pada akhirnya dapat mengurangi tindakan kekerasan dan penelantaran.

Provide care to the elderly with chronic diseases induce a feeling of strain or burden on the caregiver that can affect on the quality of family life. This study aims to know the factors associated with caregiver burden for the elderly. This research is an observational research with cross-sectional approach using multiple logistic regression test. Total sample is 205 respondents which is taken by cluster multistage sampling. Significant relationship was found in the age ($p=0.052$; $\alpha=0.05$) the health status ($p=0.018$; $\alpha=0.05$), knowledge ($p=0.046$; $\alpha=0.05$), and satisfaction ($p=0.033$; $\alpha=0.05$) of family with the burden of care. The factors that most contribute to caregiver burden is the family health status ($OR=2.632$). A picture of the level burden experienced by families in caring for the elderly can be used as an input to develop a family empowerment and health promotion

programs to reduce caregiver burden and may reduce violence and negligence.