

Pengaruh range of motion (ROM) intradialisis terhadap aktivitas fisik pasien hemodialisa yang mengalami fatigue = Effect of intradialysis range of motion (ROM) to physical activity hemodialysis patients who experience fatigue

Danny Putri Sulistyaningrum, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20454810&lokasi=lokal>

Abstrak

Fatigue salah satunya akibat akumulasi sampah metabolism yang mengganggu sistem kerja korteks serebral dan mengakibatkan penurunan aktivitas fisik. Range of motion ROM intradialisis bermanfaat dalam meningkatkan perfusi dan pembuangan sampah metabolism. Namun belum ada penelitian yang mengkaji pengaruh ROM intradialisis untuk meningkatkan aktivitas fisik pada pasien hemodialisa yang mengalami fatigue. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh ROM intradialisis terhadap aktivitas fisik pasien hemodialisa yang mengalami fatigue.

Penelitian ini menggunakan quasi experiment, dengan pre – post test with control group melibatkan total 34 responden yang dipilih dengan teknik consecutive sampling. Analisis statistik penelitian ini menggunakan uji Mann Whitney. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh ROM intradialisis terhadap aktivitas fisik pada pasien hemodialisa yang mengalami fatigue $p = 0.000$; $\alpha = 0.05$. Rekomendasi pada penelitian ini adalah perawat hemodialisa perlu menerapkan intervensi ROM intradialisis pada asuhan keperawatan pasien hemodialisa yang mengalami fatigue untuk meningkatkan aktivitas fisik pasien hemodialisa.

.....

Fatigue occurs because of accumulation of metabolic waste and disrupting work of cerebral cortex system. It effectson decreasing in physical activity. Intradialysis range of motion ROM is useful in improving perfusion and disposal of metabolic waste. However, there has been no research have reviewed the effect of intradialysis ROM to increase physical activity in hemodialysis patients who experience fatigue. This study aimed to identify the effect of intradialysis ROM to physical activity of hemodialysis patients who experience fatigue.

This study used quasi experiment, with pre post test with control group involving a total of 34 respondents selected by consecutive sampling technique. Analysis statistical this study using Mann Whitney test. The results showed there was influence of intradialysis ROM to physical activity hemodialysis patients who experience fatigue $p = 0.000$ $\alpha = 0.05$. Recommendation in this research is nurses should apply intradialysis ROM intervention as nursing care in patient with fatigue hemodialysis to increase their physical activity.