

## Hubungan antara derajat aktivitas penyakit dengan depresi pada pasien artritis reumatoid = Association between disease activity and depression in rheumatoid arthritis patients

Myra Puspitasari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20455672&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Nama : Myra Puspitasari  
Program Studi : Ilmu Penyakit Dalam  
Judul : Hubungan Antara Derajat Aktivitas Penyakit dengan Depresi pada Pasien Artritis Reumatoid. Latar Belakang. Artritis Reumatoid AR merupakan penyakit kronik, sistemik. Depresi sering menyertai pasien AR sebanyak 20-30 . Derajat aktivitas penyakit AR dapat mempengaruhi terjadinya depresi. Tujuan. Mengetahui prevalensi depresi pada pasien AR dan mengetahui hubungan antara derajat aktivitas penyakit dengan depresi pada pasien AR. Metode. Penelitian ini merupakan studi potong lintang yang dilakukan dengan memeriksa pasien AR di poliklinik reumatologi RSCM yang memenuhi kriteria inklusi dengan consecutive sampling selama periode Januari sampai Maret 2017. Pasien dinilai derajat aktivitas penyakitnya dengan menggunakan DAS 28 dan diminta untuk mengisi kuesioner BDI. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan metode chi-square. Hasil Penelitian. Pada studi ini, didapatkan hasil bahwa prevalensi depresi pada pasien AR di RSCM adalah 35,9 dengan interval kepercayaan 95 sebesar 30 ndash; 42 . Derajat aktivitas penyakit memiliki hubungan yang bermakna dengan depresi pada pasien AR.  $p = 0,001$  . Kesimpulan. Prevalensi kejadian depresi pada pasien AR di RSCM pada adalah sebesar 35,9 . Derajat aktivitas penyakit memiliki hubungan yang bermakna dengan depresi pada pasien AR. Kata Kunci. Artritis Reumatoid, derajat aktivitas penyakit, depresi.

<hr />

#### <b>ABSTRACT</b><br>

Name Myra Puspitasari  
Study Programme Internal Medicine  
Title Association Between Disease Activity and Depression in Rheumatoid Arthritis Patients. Background. Rheumatoid Arthritis RA is a chronic, systemic disease that cause synovial inflammation and progressive destruction to cartilages and deformities. Prevalence of depression in RA patients is 20 to 30 . Disease activity is considered to have relation with depression. Objective. To identify the prevalence of depression in RA patients and to identify association between disease activity index and depression in RA patients. Method. A cross sectional study of 145 RA patients that fulfilled the inclusion and exclusion criteria was held in Rheumatology Outpatient Clinic at RSCM from January to March 2017. Evaluation of DAS 28 and BDI was done to the patients. Chi square method was used to analyse the statistic. Results. The prevalence of depression in RA patients at RSCM is 35,9 with 95 confidence of interval 30 42 . There is significant relation between disease activity with depression in rheumatoid arthritis patient  $p 0,001$  . Conclusion. The prevalence of depression in RA patients at RSCM is 35,9 . There is significant relation between disease activity with depression in RA patients. Keywords. Rhematoid arthritis, disease activity index, depression.