

Perbedaan persepsi kualitas hidup antara yang dipersepsikan pasien pasca stroke dan yang dipersepsikan caregiver = Differences in perception of quality of life between post-stroke patients and their caregivers

Gitalia Putri Medea, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20467779&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Kualitas hidup pasien pasca stroke dapat diketahui berdasarkan laporan dari pasien stroke dengan wawancara terstruktur atau dengan pengisian kuesioner. Namun, beberapa dari pasien stroke tidak dapat melaporkan kualitas hidupnya sebagai akibat dari gangguan bahasa, efek kognitif lainnya dari stroke atau kondisi yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perbedaan persepsi kualitas hidup antara perspektif pasien pasca stroke dan caregiver. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang (Cross Sectional) yang melibatkan 115 pasien dan 115 caregiver. Analisis statistik yang digunakan Mann Whitney. Hasil analisis menunjukkan tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara persepsi kualitas hidup dari pasien dan persepsi kualitas hidup dari caregiver ($p = 0,166$; $> 0,05$). Tidak terdapat perbedaan secara signifikan pada domain fisik ($p = 0,278$; $> 0,05$), psikologis ($p = 0,068$; $> 0,05$), hubungan sosial ($p = 0,976$; $> 0,05$), dan lingkungan ($p = 0,157$; $> 0,05$) dari kualitas hidup yang dipersepsikan oleh pasien dan yang dipersepsikan oleh caregiver. Perawat dapat memperoleh informasi dari caregiver saat pasien tidak dapat memberikan informasi terkait kualitas hidupnya.

<hr>

ABSTRACT

The quality of life of post-stroke patients might be identified on reports of stroke patients by structured interviews or questionnaires. However, some stroke patients might be unable to report their quality of life due to language disorders, other cognitive effects of stroke or pre-existing conditions. The general purpose of identifying differences in perception of quality of life between perceived patients post stroke and perceived caregiver. Research Design: using cross sectional design. Samples: Research sample size is 115 patients and 115 caregivers. Statistical analysis used Mann Whitney test. The results showed no significant difference between perception of quality of life by patient and perception of quality of life by caregiver ($p = 0,166$; $> 0,05$). There were no significant differences in the physical domain ($p = 0,278$; $> 0,05$), psychological ($p = 0,068$; $> 0,05$), social relations ($p = 0,976$; $> 0,05$), and environment ($p = 0,157$; $> 0,05$) of the perceived quality of life by the patient and perceived by the caregiver. Nurse may obtain information from the caregiver when the patient is unable to provide information about the quality of his/her life.